

كتيب

مجموعة مستلزمات الصحة  
الإيجابية المشتركة بين الوكالات  
للاستخدام في الأزمات



الإصدار الخامس

2011



# مجموعة مستلزمات الصحة الإيجابية المشتركة بين الوكالات للاستخدام في الأزمات

الإصدار الخامس

## الصفحة

## المحتويات

2	استهلال
3	شكر وتقدير
4	1. مقدمة
4	1.1 الأهداف
5	1.2 النقاط الرئيسية
7	1.3 الحصول على المجموعات
7	1.3.1 من يستطيع طلب المجموعات؟
7	1.3.2 نقاط الاتصال بصندوق الأمم المتحدة للسكان
8	1.3.3 الشروط الواجب توافرها لطلب المجموعات
8	1.3.4 التمويل
8	1.3.5 كلفة المجموعات
8	1.3.6 تسليم الطلبية
8	1.3.7 إرسال الطلبية
9	1.3.8 التغليف
9	1.3.9 الجودة
10	1.4 معلومات عملية
10	1.4.1 نظرة عامة على المجموعات
11	1.4.2 المراجع ومواد التدريب
13	1.5 مثال لطلبية من أجل مخيم لاجئين يضم 20 ألف شخص
14	2. محتويات مجموعات مستلزمات الصحة الإيجابية المشتركة بين الوكالات
14	الفئة 1: المجموعات التي تلبى احتياجات 10 آلاف شخص لمدة 3 أشهر
15	المجموعة 0: اللوازم الإدارية/الوازم التدريب
16	المجموعة 1: الأوقية الذكري
17	المجموعة 2: الولادة النظيفة. الأفراد
18	المجموعة 3: علاج ما بعد الاغتصاب
20	المجموعة 4: وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن
21	المجموعة 5: علاج العدوى المنقولة جنسياً
23	الفئة 2: المجموعات التي تلبى احتياجات 30 آلاف شخص لمدة 3 أشهر
24	المجموعة 6: المساعدة في الولادة السريرية
27	المجموعة 7: اللوالب الرحمية
28	المجموعة 8: إدارة الإجهاض التلقائي ومضاعفات الإجهاض
30	المجموعة 9: خياطة التمزق (عنق الرحم والمهبل) والفحص المهبلي
31	المجموعة 10: التوليد بشفط الجنين
32	الفئة 3: المجموعات المستخدمة لتلبية احتياجات 150 ألف شخص لمدة 3 أشهر
33	المجموعة 11: مجموعة مستوى الإحالة للصحة الإيجابية
38	المجموعة 12: مجموعة نقل الدم
39	الملاحق
39	الملحق 1: أبعاد مجموعات مستلزمات الصحة الإيجابية
41	الملحق 2: الافتراضات المستخدمة في حساب الإمدادات

## استهلال

قامت مؤسسة ماري ستوبس الدولية بتطوير أول مجموعة للصحة الإنجابية في عام 1992، تحديداً لاستخدامها خلال الأزمة البوسنية. عندما تعرضت الآلاف من النساء للاعتداء الجنسي ونشأت الحاجة الملحة لمعدات طبية مناسبة. بعدها قامت وحدة النشاط الجنسي وتنظيم الأسرة في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا بمراجعة وتحديث هذه المجموعات من أجل مرحلة ثانية في البوسنة.

في عام 1997، أدت الاضطرابات في ألبانيا إلى انهيار النظام الصحي. وأبدت مستشفيات الولادة حاجتها الماسة إلى المعدات الجراحية الأساسية للاستجابة لاحتياجات الصحة الإنجابية للمرأة. فتم تصميم مجموعة الإحالة/ الجراحة للتوليد من قبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في البلاد. والتي كان المقصود منها أن تنكف مع الأوضاع المحلية.

بعد ذلك تم تكوين الإصدار الثالث من المجموعة من جانب عدد من الوكالات، بما في ذلك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، للاستجابة لأزمة اللاجئين في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا في 1997.

دفعت هذه التجارب صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إنتاج مجموعة موحدة من مستلزمات الصحة الإنجابية لاستخدامها من قبل الوكالات الإنسانية. وكان الهدف من هذه المجموعات الإسراع في توفير خدمات الصحة الإنجابية الملائمة في حالات الطوارئ واللاجئين. وقد ناقش الإصدار الأول من مجموعات الصحة الإنجابية الحالية ووافق عليها أعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات (IAWG) والمعني بالصحة الإنجابية في يونيو/حزيران 1997. وأصبح متاحاً اعتباراً من يونيو/ عام 1998. وأجري صندوق الأمم المتحدة للسكان استطلاعاً بين المستخدمين الميدانيين في نهاية عام 1999. ونوقشت نتائج الدراسة في اجتماع الفريق العامل المشترك بين الوكالات الخامس في فبراير/شباط 2000. وفي يوليو/تموز 2000، أصدرت مجموعة فرعية منبثقة عن الفريق العامل المشترك بين الوكالات نسخة منقحة، في ضوء إسهامات من كل من المستخدمين الميدانيين وأعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات. كذلك أثمرت المراجعات أخرى التي تمت في 2003 و2005 و2010 عن تعديل محتويات المجموعات. على أساس اقتراحات من المستخدمين والاحتياجات التي تم تحديدها حديثاً. وقد باتت المجموعات الآن في إصدارها الخامس. يستعرض هذا الكتيب معلوماتٍ عن محتوياتها واستخدامها وإجراءات طلبها اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2011.

مجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية الخاصة بالمجموعة المشتركة بين الوكالات تعد مُكتملة لمجموعة مستلزمات الصحة في حالات الطوارئ الخاصة بنفس المجموعة، والتي صُممت لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية للسكان المشردين من دون مرافق طبية. لمزيد من المعلومات، انظر

<http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js13486e>

وندعو المستخدمين لإبداء التعليقات على النسخة المنقحة من مجموعة مستلزمات الصحة الإنجابية. وستتم دراسة جميع المقترحات في التنقيحات المستقبلية. يُرجى إرسال التعليقات والاقتراحات إلى:

hrb@unfpa.org

## شكر وتقدير

شارك العديد من الأفراد في إعداد وتنقيح الإصدارات المختلفة من مجموعات مستلزمات الصحة الإيجابية للفريق العامل المشترك بين الوكالات. ومن بينهم: أولكسندر بابانين، جاكلين بيل، جينيفر بلوم، كيت بيرنز، بامبلا ديلارجي، ويلما دودينز، فرانس دوناي، دينا إينجل، فيدل فونت، لوريلي غودبير، روبن غراي، ميريام هينكنز، باتريشيا هايندمارش، منير إسلام، آن يانسنس، ثيلدي كنودسن، ساندرأ كراوس، سيلينغي لآخفا، سيرج ماليه، ماثيوز ماثاي، جانيت مايرز، دوريس ماغريدتشيان، مينت تيدار، جوناثان بادزي نادزي، فرانسيس إندوا، هنريك نيلسن، نغوين ترانتوان، روزيلاده أونديكو، آن بوتيجيرار، سوزان بوردين، وهيبية سكتني، هاكان سانديلاده، كريستيان سوندرز، ماريان شيلبيرورد، ميشال تيلهيدز، توماس ليزا، سوزان تول، بيفرلي تاكر، تومو واتانابي .

كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأنيك دبريان، وتيريز ديلفو، ودانيال بيروتي، ومونيك سوبيو لما قدموه من إسهامات هامة.

## 1. مقدمة

### 1.1 الأهداف

كان أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في سبتمبر/أيلول 1994 هو جعل الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، متاحة للجميع بحلول عام 2015. ولفت برنامج العمل الانتباه إلى احتياجات السكان المعرضين للخطر بشكل خاص. بما في ذلك المشردين واللاجئين. ففي السابق، قلما كانت الصحة الإنجابية تؤخذ في الاعتبار عند الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية. وعلى هذا الأساس، تم إرساء مفهوم مجموعة الخدمات الأولية التي تمثل الحد الأدنى (MISP) في الندوة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة الإنجابية في حالات الطوارئ التي عقدت في يونيو/حزيران 1995.

يتمثل الهدف من مجموعة الخدمات الأولية التي تمثل الحد الأدنى في تقليل الوفيات والاعتلال المرتبطتين بقضايا الصحة الإنجابية أثناء الأزمات. لا سيما بين النساء. ويتم تحقيق ذلك عن طريق توفير الخدمات ذات الأولوية في مجال الصحة الإنجابية من بداية الاستجابة الإنسانية للأزمة. بما في ذلك عند إنشاء مخيمات للاجئين. وتنفذ هذه المجموعة من الخدمات الأولية التي تمثل الحد الأدنى بطريقة منسقة على أيدي موظفين مدربين بشكل مناسب. وتشمل مجموعة من الأنشطة والمعدات واللوازم ذات الأولوية في مجال الصحة الإنجابية، فضلاً عن أنشطة التخطيط. ولابد من توافر ما يلي لتنفيذ هذه المجموعة بشكل مناسب:

- الموظفون المدربون، بما في ذلك منسق الصحة الإنجابية؛
- البروتوكولات ومعينات العمل المتعلقة بتنفيذ تدخلات مختارة؛
- الأدوية الأساسية والمعدات واللوازم الأساسية.

تم تجميع الأدوية الأساسية والمعدات واللوازم الضرورية لتوفير الرعاية الصحية الإنجابية في الأزمات في واحدة من المجموعات المعبأة مسبقاً والمصممة خصيصاً - وهي مجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية المشتركة بين الوكالات. وتتوافق أهداف المجموعات مع تلك المنصوص عليها في الدليل الميداني المشترك بين الوكالات بشأن الصحة الإنجابية في الحالات الإنسانية<sup>1</sup>:

#### ▲ الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز):

- ضمان سلامة ممارسات نقل الدم (المجموعة 12)؛
- تسهيل الاحتياطات القياسية وفرض احترامها (مدمجة في جميع المجموعات)؛
- توفير الأوقية الذكرية المجانية (المجموعة 1)؛

#### ▲ منع العنف الجنسي وإدارة عواقبه:

- اتخاذ التدابير لحماية السكان من العنف الجنسي؛
- توفير الرعاية الطبية للناجيات من الاغتصاب (المجموعات 3 و9)؛
- ضمان إمام المجتمع بالخدمات الطبية المتوفرة

#### ▲ منع زيادة معدل الاعتلال والوفيات بين المواليد والأمهات:

- ضمان توافر المستلزمات لإدارة مضاعفات الولادة والمواليد في المرافق الصحية (المجموعات 6 و8 و9 و10)، وفي مستشفيات الإحالة (المجموعات 11 و12)؛
- توفير مستلزمات الولادة النظيفة للنساء الحوامل والقابلات للاستخدام في الولادات المنزلية عندما يتعذر الوصول إلى المرافق الصحية (المجموعة 2)؛
- وضع نظام إحالة لتسهيل النقل والاتصالات

#### ▲ التخطيط لتوفير خدمات صحة الإنجابية الشاملة حالما تسمح الحالة (الإمدادات الإدارية لتسهيل التنسيق والتخطيط مدرجة في المجموعة 0)

وقد أظهرت التجربة أنه، بالإضافة إلى توفير مجموعة الخدمات الأولية التي تمثل الحد الأدنى، من المهم أيضاً الاستجابة لاحتياجات الصحة الإنجابية الأخرى في المرحلة الأولى من الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك:

- ▲ ضمان توافر وسائل منع الحمل لتلبية الطلب (المجموعات 4 و7).
- ▲ توفير العلاج التلازمي للمرضى الذين يعانون من أعراض العدوى المنقولة جنسياً (المجموعة 5).

## 1.2 النقاط الرئيسية

▲ صُممت مجموعات الصحة الإيجابية لاستخدامها في المرحلة المبكرة من حالة الأزمة صُممت مجموعات الصحة الإيجابية المشتركة بين الوكالات في المقام الأول لتسهيل تقديم الخدمات ذات الأولوية في مجال الصحة الإيجابية للسكان المشردين من دون مرافق صحية. أو حينما تتعطل المرافق الطبية خلال الأزمات.<sup>2</sup> وهي تحتوي على الأدوية الأساسية واللوازم والمعدات لاستخدامها لفترة محدودة من الوقت ومع عدد معين من الناس.

قد لا تناسب بعض الأدوية والأجهزة الطبية التي تتضمنها المجموعات جميع الثقافات والبلدان. وهذا أمر لا مفر منه لأنها مجموعات موحدة من مستلزمات الطوارئ وهي مصممة للاستخدام في جميع أنحاء العالم، ومسبقة التعبئة وجاهزة للإرسال الفوري. وليس الهدف من المجموعات أن تكون بمثابة إعادة إمداد لما ينفذ. وإذا استخدمت على هذا النحو، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم موادٍ وأدويةٍ لا حاجة لها.

ويجب التأكيد على أنه رغم أن توفير الأدوية والأجهزة الطبية على هيئة مجموعات قياسية سابقة التعبئة يكون مناسباً في وقت مبكر في حالة الطوارئ؛ إلا أنه ينبغي تقييم الاحتياجات المحلية المحددة في أقرب وقت ممكن. وطلب المزيد من اللوازم وفقاً لذلك. ولذلك، بمجرد تحديد خدمات الصحة الإيجابية الأساسية، ينبغي على منسق الصحة الإيجابية تقييم احتياجات الصحة الإيجابية وإعادة طلب الأدوية والمستهلكات والمعدات على أساس استهلاك هذه العناصر. من أجل ضمان استمرار برنامج الصحة الإيجابية. وينبغي بذل كل الجهود لتعزيز أو تطوير نظام معلومات إدارة الخدمات اللوجستية للمستلزمات الطبية. وينبغي أن تتم عملية إعادة الطلب من خلال القنوات العادية (عن طريق نظام الشراء الوطني أو المنظمات غير الحكومية. أو غيرها من الوكالات) أو من خلال فرع خدمات المشتريات لصندوق الأمم المتحدة للسكان (انظر الإطار أدناه).

### كيفية إرسال طلب متابعة لمستلزمات الصحة الإيجابية من خلال فرع خدمات المشتريات بصندوق الأمم المتحدة للسكان

1. حدد أي الأدوية والمستهلكات والمعدات الطبية تم استهلاكها. وبأي كميات.
2. قَدِّر الاحتياجات على مدى السنة المقبلة.
3. أرسل الطلبية من خلال فريق مشتريات الطوارئ بصندوق الأمم المتحدة للسكان (انظر القسم 1.3.2).

### العملاء الجدد الذين يطلبون الإمدادات

- يصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان فاتورة أولية مع مذكرة تفاهم
- في حالة قبول كل من الفاتورة الأولية ومذكرة التفاهم، عليك (الطالب) التوقيع على مذكرة التفاهم وتحويل الأموال إلى حساب الصندوق؛
- يقوم الصندوق بعدها بإصدار أوامر الشراء المطلوبة. ويرسل نسخة منها لك بوصفك الطالب.

### مكتب الصندوق المحلية

- يقوم فريق مشتريات الطوارئ بإعادة توجيه طلبك إلى فريق المشتريات الإقليمي الذي تتبعه
- اتبع إجراءات الدفع العادية.

2 يمكن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في حالات الطوارئ من خلال مجموعة قياسية لمستلزمات الصحة. تحتوي على الأدوية الأساسية واللوازم والمعدات. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية هذه المجموعة قبل نحو 30 عاماً بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. خضعت المجموعة للتنقيح في 1998 وفي 2006 وفي 2011. وصارت تُعرف الآن باسم المجموعة المشتركة بين الوكالات لمستلزمات الصحة في حالات الطوارئ لعام 2011 (IEHK2011). وهي تشمل لوازم المقابلة، والعلاج في مرحلة ما بعد الاعتصاب، والإمدادات اللازمة لاستخدامها في اتخاذ الاحتياطات القياسية، للسماح بتقديم بعض المكونات الأساسية لخدمات الصحة الإيجابية. لتقديم خدمات أكثر شمولاً في مجال الصحة الإيجابية في حالات الطوارئ. توصي IEHK 2011 بمجموعات مستلزمات الصحة الإيجابية.

## ▲ صُممت كل مجموعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تستجيب كل واحدة من مجموعات مستلزمات الصحة الإيجابية لحاجة معينة في مجال الصحة الإيجابية وتحتوي على لوازم يتم احتسابها لعدد معين من الناس لفترة ثلاثة أشهر. وبالتالي يمكن طلب المجموعات بشكل منفصل كاستجابة "قائمة بذاتها" لحالة معينة. وثمة استثناء واحد يتعلق بمعدات التعقيم: المجموعات 7 و 8 و 9 لا تشمل معدات تعقيم لأنها عادة ما تُستخدم بالاشتراك مع المجموعة 6 والتي تحتوي على نوع من أجهزة التعقيم بالبخار (الأوتوكلاف) يعمل بالضغط. أما المجموعة 11 (مستوى الإحالة) فلا تتضمن جهاز التعقيم بالبخار، لأنه يُفترض أن المستشفيات لديها خدمة التعقيم.

▲ صُممت بعض المجموعات للاستخدام فقط من قبل طاقم العاملين المؤهلين والمدربين في مجال الصحة. مستوى المهارات المطلوبة لاستخدام كل مجموعة مفصل في هذا الكتيب. وننصحك بمراجعة هذه المعلومات قبل طلب المجموعات.

▲ يتم تحديث مجموعات الصحة الإيجابية بانتظام تتم مراجعة مجموعات مستلزمات الصحة الإيجابية المشتركة بين الوكالات بانتظام. وذلك باستخدام أحدث المعلومات المتوفرة. ونرجو من المستخدمين التعليق على كفاءة المجموعات الفردية في العمل على أرض الميدان. وسيتم النظر في جميع المقترحات في التنقيحات المستقبلية.

## ملاحظات

- المجموعتان 6 و 11: الديازيبام والبنزازوسين هما مادتان خاضعتان للرقابة. وتتطلبان رخصة استيراد من بلد المقصد قبل الشحن. ولأن الحصول على هذا الترخيص قد يستغرق بعض الوقت، فلم يتم تضمين هذه المستحضرات الصيدلانية. وينبغي شراؤها محلياً.
- المجموعات 6 و 8 و 11 و 12: تحتوي هذه المجموعات على عناصر يجب الاحتفاظ بها باردة: الأوكسيتوسين واختبارات الكشف عن فصيلة الدم والتهاب الكبد والزهري (الراجنة البلازمية السريعة (RPR)). فبالنسبة لهذه العناصر ينبغي المحافظة على سلسلة التبريد أثناء النقل والتخزين. ولهذا يتم تغليف هذه المنتجات وشحنها بشكل منفصل وذلك في صندوق تبريد. وتظل مادة الأوكسيتوسين فعالة حتى لو حدث انقطاع مؤقت في سلسلة التبريد، رغم أنها قد تفقد بعضاً من فعاليتها.

## التغييرات الرئيسية منذ الإصدار الرابع من مجموعة مستلزمات الصحة الإيجابية المشتركة بين الوكالات

### المجموعة 3: علاج ما بعد الاغتصاب

أصبحت المجموعتان 3 و 3أ ب الآن مجموعة واحدة وهي المجموعة 3، مما يعكس أهمية إعطاء جميع الناجيات مجموعة شاملة من رعاية ما بعد الاغتصاب. بما في ذلك المعالجة الظنية للأمراض المنقولة جنسياً، ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ والوقاية من المرض بعد التعرض لمنع فيروس نقص المناعة البشرية (إتش أي في). عند الاقتضاء

### المجموعة 6: المساعدة في الولادة السريية

للسماح بمزيد من المرونة في الطلب. تم تقسيم المجموعة 6 إلى الجزء أ: المعدات القابلة لإعادة الاستخدام والجزء ب: الأدوية والمعدات المعدة للاستعمال مرة واحدة. يُضاف جهاز التنفس، بالتشغيل اليدوي، للرضع للأطفال. لإنعاش المواليد

### المجموعة 8: إدارة الإجهاد التلقائي ومضاعفات الإجهاد

يُضاف الميزوبروستول 200 ميكروغرام. لإدارة الإجهاد غير المكتمل موسعات دنيستون البوليمر. تحل محل موسعات الرحم هيغار، والتي لم تعد مدرجة.

## 1.3 الحصول على المجموعات

### 1.3.1 من يستطيع طلب المجموعات؟

- يمكن للهيئات التالية طلب مجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية:
- فرع الاستجابة الإنسانية (HRB) بصندوق الأمم المتحدة للسكان;
  - المكاتب المحلية لصندوق الأمم المتحدة للسكان;
  - وكالات التمويل، مثل قسم المساعدات الإنسانية (ECHO) بالجماعة الأوروبية والبنك الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (DFID) والوكالة الكندية للتنمية الدولية (سيدا) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID);
  - صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها، مثل مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (UNAIDS) وإدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام (DPKO);
  - الوكالات الدولية، مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تربطها مذكرة تفاهم بالصندوق;
  - السلطات الوطنية.

### 1.3.2 نقاط الاتصال بصندوق الأمم المتحدة للسكان

يمكن طلب المجموعات مباشرة من:

UNFPA Procurement Services Branch

Emergency Procurement Team

Midtermolen 3

Copenhagen 2100

Denmark

هاتف: 45+ 3546 7000 / فاكس: 45+ 3546 7018

البريد الإلكتروني: [rhkits@unfpa.org](mailto:rhkits@unfpa.org) / [HYPERLINK "mailto:rhkits@unfpa.org"](mailto:rhkits@unfpa.org)

ويمكن الحصول على معلومات عن المجموعات أو المساعدة في الطلب من: موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان في المكاتب الميدانية (في عاصمة البلد): مفوضية شؤون اللاجئين أو وكالة تنسيق أخرى خاصة بالأمم المتحدة في البلد:

UNFPA/HRB

3rd Avenue 605

New York, NY 10016

USA

هاتف: 1+ 212-297-5245 / 5254

UNFPA/HRB

chemin des Anémones ,13-11

Chatelaine, Geneva 1219

Switzerland

هاتف: 41+ 22 917 80 16 / فاكس: 41+ 22 917 83 15

البريد الإلكتروني: [hrb@unfpa.org](mailto:hrb@unfpa.org) / [HYPERLINK "mailto:hrb@unfpa.org"](mailto:hrb@unfpa.org)

### 1.3.3 الشروط الواجب توافرها لطلب المجموعات

قبل طلب المجموعات :

- إجراء تقييم سريع للأوضاع المحلية للتأكد من أن هناك حاجة لمجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية. وتحديد الأنواع المطلوبة (أي هل كان السكان يستخدمون الواقي الأثنوي أو اللولب قبل الأزمات؟) وأماكن الحاجة إليها.
- تحديد كمية ونوع مجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية وفقاً لحجم السكان الذين ستتم خدمتهم.
- ومكان ونوع المراكز الصحية ومهارات مقدمي الرعاية الصحية في هذه المراكز.
- التأكد من توافر الأموال اللازمة (انظر أدناه)

### 1.3.4 التمويل

هناك نوعان من مصادر التمويل الممكنة :

- (أ) الموارد الخاصة (على سبيل المثال. من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو وكالة أخرى) ينبغي إرسال الطلبية مباشرة إلى فرع خدمات المشتريات التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان (انظر 1.3.2).
- ويجب أن يتلقى الصندوق الأموال قبل أن يتم شحن المجموعات.
- (ب) أموال صندوق الأمم المتحدة للسكان
- يمكن سحب الأموال من البرنامج القطري العادي للصندوق (بما في ذلك المشاريع الشاملة).
- ويمكن للمكاتب القطرية للصندوق التقدم بطلب لفرع الاستجابة الإنسانية والمكاتب الإقليمية للحصول على تمويل في حالات الطوارئ.

### 1.3.5 تكلفة المجموعات

- تتغير تكلفة كل مجموعة دورياً. ويمكن الحصول على أحدث الأسعار من فرع خدمات المشتريات بالصندوق أو مكتب الصندوق القطري.
- تكاليف الشحن الجوي: ينبغي إضافة مبلغ يعادل 30% من تكلفة كل مجموعة لتغطية هذه النفقات (باستثناء مجموعة الواقي الذكري، والتي يمكن أن تتراوح تكاليف شحنها ما بين 30% و 100% من الكلفة الأساسية. بحسب الوجهة).
- التكاليف العامة: يفرض الصندوق رسوماً رمزية قدرها 5% لتغطية التكاليف الإدارية.

### 1.3.6 تسليم الطلبية

- في حالة الطوارئ: يتم التسليم خلال 2-7 أيام بعد الانتهاء من تخصيص الميزانية.
- في حالة عدم وجود أزمة: يتم التسليم خلال 10-12 أسابيع بعد الانتهاء من تخصيص الميزانية.

### 1.3.7 إرسال الطلبية

عند إرسال طلبية. ينبغي تقديم المعلومات التالية لفرع خدمات المشتريات بصندوق الأمم المتحدة للسكان :

- توافر الأموال وكود الميزانية التي يمكن تحميل الثمن عليها. لا يمكن أن يتم الشحن حتى تُسوّى مسائل التمويل.
- اسم المسؤول عن ترتيب وتنسيق تسليم المجموعات وبيانات الاتصال به.
- اسم المسؤول عن استلام مجموعات في الميدان وبيانات الاتصال به كاملة (العنوان. الهاتف. الفاكس. البريد الإلكتروني).

وفي حالة الإرسال إلى جهات متعددة في البلد الواحد. لا بد من تقديم قائمة مفصلة تبين الجهات المعنية وأنواع وكميات كل مجموعة إلى كل جهة. والأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم. وما إلى ذلك (على سبيل المثال. عدد 4 مجموعة 1 وعدد 2 مجموعة 6 إلى المنظمة غير الحكومية أ والعنوان والشخص المسؤول ورقم الهاتف: عدد 3 مجموعة 2 إلى المركز الصحي ب والعنوان والشخص المسؤول ورقم الهاتف: عدد 2 مجموعة 11 إلى المستشفى ج. وهلم جرا).

لتسهيل الجوانب اللوجستية داخل البلد. تتميز الصناديق التي تحتوي على اللوازم بأنها:

- تحمل وزن وحجم كل مجموعة:
- صغيرة بحيث يستطيع أن يتعامل معها شخص واحد أو اثنين:
- مبين عليها بشكل واضح رقم المجموعة وأرقام الصندوق والوصف والمرسل إليه والمعلومات الأخرى ذات الصلة:
- مميزة بشريط ملون على جميع الأطراف. بلون مميز لكل مجموعة (انظر القسم 1.4).
- تتضمن جراباً ذاتي اللصق مثبت علي الجزء الخارجي منها. يتضمن قائمة تفصيلية بالمحتويات.

لتحسين نوعية المجموعات، من المهم الحصول على ردود الأفعال من المتلقين. لذا فنحن نشجع الإذلاء بتعليقات حول التعبئة والتغليف، ومسائل الشحن، وجودة المنتجات، وغيرها. كما نشجع أيضاً المتلقين على تقديم اقتراحات بشأن الكيفية التي يمكن بها تحسين نظام المشتريات. الرجاء توجيه هذه المعلومات لفرع خدمات المشتريات بالصندوق (انظر القسم 1.3.2).

## 1.4 معلومات عملية

### 1.4.1 نظرة عامة على المجموعات

يمكن تصنيف مجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية إلى ثلاث "فئات". تستهدف كل فئة مستوى مختلف من مستويات تقديم الخدمات الصحية على النحو التالي:

#### الفئة 1

تشمل ست مجموعات. عناصر هذه المجموعات مخصصة لاستخدامها من قبل مقدمي الخدمة الذين يقدمون خدمات رعاية الصحة الإنجابية على مستوى المجتمع المحلي ومستوى الرعاية الصحية الأولية. وضمت كل مجموعة لتلبية احتياجات 10 آلاف شخص لمدة 3 أشهر. تحتوي المجموعات بشكل رئيسي على الأدوية والسع الاستهلاكية. وتنقسم المجموعتان 1 و2 إلى الجزأين أ وب. الذين يمكن طلب كل منهما بشكل منفصل.

الرمز اللوني		
برتقالي	اللوازم الإدارية/اللوازم التدريب	المجموعة 0
أحمر	الأوقية (أ وب)	المجموعة 1
أزرق داكن	الولادة النظيفة، الأفراد (أ وب)	المجموعة 2
وردي	علاج ما بعد الاغتصاب	المجموعة 3
أبيض	وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن	المجموعة 4
فيروزى	علاج العدوى المنقولة جنسياً	المجموعة 5

#### الفئة 2

تضم خمس مجموعات. وتحتوي على مواد يُعاد استخدامها وأخرى مُعدّة للاستخدام لمرة واحدة. لاستخدامها من قبل مقدمي الرعاية الصحية المدربين. والذين يمتازون بمهارات مختارة في القبالة والتوليد والتعامل مع حديثي الولادة على مستوى المركز الصحي أو المستشفى. وقد ضُمت هذه المجموعات لاستخدامها مع عدد سكان يبلغ 30 ألف شخص لمدة 3 أشهر. ومن الممكن طلب هذه المجموعات لعدد سكان أقل من 30 ألف شخص. وهذا يعني أن الإمدادات ستستمر لفترة أطول. تتضمن المجموعة 6 جزأين. أ وب. والذين يُستخدمان معاً ولكن يمكن طلب كل منهما بشكل منفصل.

الرمز اللوني		
بني	المساعدة في الولادة السريرية (أ وب)	المجموعة 6
أسود	لوازم رجمية	المجموعة 7
أصفر	إدارة الإجهاض التلقائي ومضاعفات الإجهاض	المجموعة 8
أرجواني	خيطة التمزق (عنق الرحم والمهبل) والفحص المهبلي	المجموعة 9
رمادي	التوليد بنشفط الجنين	المجموعة 10

### الفئة 3:

في الحالات الإنسانية، يُحال المرضى من السكان المتضررين إلى أقرب مستشفى. وقد يتطلب هذا المستشفى دعماً من حيث المعدات واللوازم من أجل توفير الخدمات اللازمة لهذا العبء الإضافي في الحالة. تشمل الفئة 3 مجموعتين. تضمن اللوازم القابلة لإعادة الاستخدام وتلك المعدة للاستخدام لمرة واحدة لتوفير الرعاية الشاملة في حالات الطوارئ وعند التوليد ولالأطفال حديثي الولادة على مستوى الإحالة (التوليد الجراحي). ويُقدر أن مستشفى على هذا المستوى تخدم حوالي 150 ألف شخص. لذا يمكن اللوازم التي تشملها هذه المجموعات خدمة هؤلاء السكان لمدة 3 أشهر. تتألف المجموعة 11 من جزأين: أ وب، والذين يُستخدمان عادةً معاً ولكن يمكن طلب كل منهما بشكل منفصل.

الرمز اللوني		
أخضر فوسفوري	مجموعة مستوى الإحالة للصحة الإنجابية (أ و ب)	المجموعة 11
أخضر داكن	مجموعة نقل الدم	المجموعة 12

### 1.4.2 المراجع ومواد التدريب

- يمكن تحميل المراجع ومواد التدريب المتعلقة بالصحة الإنجابية عبر [www.rhrc.org](http://www.rhrc.org) HYPERLINK "http://www.rhrc.org"
- rhrc.org أو <http://www.who.int/reproductive-health/publications> HYPERLINK "http://www.who.int/reproductive-health/publications" ويُنصح بالاطلاع على الوثائق التالية:
- Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings: 2010 Revision for Field-testing. الفريق العامل المشترك بين الوكالات (IAWG) والمعني بالصحة الإنجابية. 2010.
  - HYPERLINK "http://www.iawg.net/resources/field\_manual.html#download" [http://www.iawg.net/resources/field\\_manual.html#download](http://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download)
  - Minimum initial services package (MISP) for reproductive health in crisis situations. A distance learning module. نيويورك. لجنة المرأة. 2007. <http://misp.rhrc.org/> HYPERLINK "http://misp.rhrc.org/"
  - Monitoring and evaluation tool kit. اتحاد استجابة الصحة الإنجابية في النزاع (2004, RHRC)
  - Guidelines for Addressing HIV in Humanitarian Settings. جنيف. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC). ديسمبر / كانون أول 2010
  - Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC). 2005
  - Clinical Management of Rape Survivors. Developing protocols for use with refugees and internally displaced persons. جنيف. منظمة الصحة العالمية/مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين/صندوق الأمم المتحدة للسكان الإصدار المنقح 2005
  - Integrated Management of Pregnancy and Childbirth. Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care. A guide for essential practice. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2006
  - Field-friendly guide to integrate emergency obstetric care in humanitarian programs. لجنة المرأة للاجئين. نيابةً عن اتحاد الاستجابة للصحة الإنجابية في النزاع (2005, RHRC)
  - Guidelines for the management of sexually transmitted infections. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2003

- UNHCR Drug Management Manual 2006. Policies, Guidelines, UNHCR List of Essential Drugs  
HYPERLINK "http://www.unhcr.org/43cf66132.html" http://www.unhcr.org/43cf66132.html
- Guidelines for the Storage of Essential Medicines and Other Health Commodities  
المتحدة/دليفير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أرلينغتون، فرجينيا. 2003.  
HYPERLINK "http://deliver.jsi.com/dlvr\_content/resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse\_Pock.pdf" http://deliver.jsi.com/dlvr\_content/resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse\_Pock.pdf
- Procurement Capacity Toolkit, Tools and Resources for Procurement of Reproductive Health  
Supplies. باث. سياتل. 2009.  
HYPERLINK "http://www.path.org/projects/procurement-toolkit.php" http://www.path.org/projects/procurement-toolkit.php
- Logistics handbook: a practical guide for supply chain managers in family planning and health  
programs. جون سنو المتحدة/دليفير بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أرلينغتون، فرجينيا. 2009.  
HYPERLINK "http://deliver.jsi.com/dlvr\_content/resources/allpubs/guidelines/LogiHand.pdf" http://deliver.jsi.com/dlvr\_content/resources/allpubs/guidelines/LogiHand.pdf

الأدوية

- The interagency list of essential medicines for reproductive health  
منظمة الصحة العالمية. 2006.  
HYPERLINK "http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR\_2006\_1/en/"  
/http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR\_2006\_1/en

## 1.5 مثال لطلبية من أجل مخيم لاجئين يضم 20 ألف شخص

### التقييم

عدد اللاجئين:	20 ألف
ملاحظات خاصة:	الإمدادات الإدارية متوفرة في العاصمة؛ الأوقية الأثوية معروفة ومستخدمة؛ اللوالب لم تكن جزءاً من وسائل منع الحمل قبل الأزمة
العاملين:	مركز صحي واحد يضم طبيباً واحداً، وممرضتين مدربتين. وقابلة مدربة، ومولدين وعاملي الرعاية الصحية بالمجتمع
مستوى الإحالة:	المستشفى المحلي على بعد 10 كم. وهو مجهز بشكل سيئ ولكن يعمل به طاقم مدرب قادر على إجراء عمليات التوليد الطارئة

### الطلبية

الكمية	البند
0	اللوازم الإدارية/اللوازم التدريب (المجموعة 0)
2	الأوقية (المجموعة 1) (أ + ب)
2	الولادة النظيفة، الأفراد (المجموعة 2) (أ و ب)
2	علاج ما بعد الاغتصاب (المجموعة 3)
2	وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن (المجموعة 4)
2	علاج العدوى المنقولة جنسياً (المجموعة 5)
1	المساعدة في الولادة السريرية (المجموعة 6) (أ + ب) (للمرافق الطبية)
0	لوالب رحمية (المجموعة 7)
1	إدارة الإجهاض التلقائي ومضاعفات الإجهاض (المجموعة 8)
1	خياطة التمزق (عقن الرحم والمهبل) (المجموعة 9)
1	التوليد بشفط الجنين (المجموعة 10)
	لدعم مستشفى الإحالة
1	مجموعة مستوى الإحالة للصحة الإنجابية (المجموعة 11) (أ و ب)
1	مجموعة نقل الدم (المجموعة 12)

### تذكير

المجموعات 0-5 تكفي لتلبية الاحتياجات المقدرة لعدد 10 آلاف شخص لمدة 3 أشهر.  
 المجموعات 6-10 تكفي لتلبية الاحتياجات المقدرة لعدد 30 ألف شخص لمدة 3 أشهر.  
 المجموعتان 11 و 12 تكفي كافية لتلبية احتياجات المقدرة لعدد 150 ألف شخص لمدة 3 أشهر.  
 (لمزيد من المعلومات انظر الملحق 2: الافتراضات المستخدمة في حساب اللوازم).

## 2. محتويات مجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية

الفئة 1

المجموعات التي تلبى احتياجات 10 آلاف شخص لمدة 3 أشهر

المجموعة 0	اللوازم الإدارية/اللوازم التدريب
المجموعة 1	الأوقية: الجزء أ (الأوقية الذكرية) والجزء ب (الأوقية الأنثوية)
المجموعة 2	الولادة النظيفة، الأفراد الجزء أ (للأم) والجزء ب (للمولدين)
المجموعة 3	علاج ما بعد الاغتصاب
المجموعة 4	وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن
المجموعة 5	علاج العدوى المنقولة جنسياً

المجموعة 0  
اللوازم الإدارية/لوازم التدريب

الاستخدام: لتسهيل أنشطة الإدارة والتدريب  
الإرشادات: لا توجد  
السكان المستهدفون: عمال الصحة المحليون والعاملون في مجال الصحة.

المحتويات

1	آلة حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية
2	لوحة (سبورة) بيضاء لاصقة قابلة للغسل والطي. 100 × 67 سم
5	غلاف برافعة. 29 × 31 سم. بألوان متعددة
20	دفتر. تدريبات. 17 × 22 سم. 5 مم-مربعات. 100 صفحة
3	دفتر. تدريبات. 21 × 29.7 سم. 5 مم-مربعات. 100 صفحة
1000	ورق. بحجم 21 × 29.7 A4. 21 × 80 غم. أبيض
3	إصبع لصق كبير
20	ملصق صندوق الأمم المتحدة للسكان. 6 × 12 سم
20	ملصق صندوق الأمم المتحدة للسكان. 11 × 22 سم
20	قلم حبر جاف. اسود
20	قلم حبر جاف. أحمر
12	قلم مؤشر (ماركر) قابل للمسح. أسود
12	قلم مؤشر (ماركر) قابل للمسح. أحمر
12	قلم مؤشر (ماركر) قابل للمسح. أزرق
12	قلم مؤشر (ماركر) لوحات. أحمر. سن 4.5 مم
12	قلم مؤشر (ماركر) لوحات. أسود. سن 4.5 مم
20	قلم رصاص. HB
2	براية أقلام رصاص. مخروطية
1	مقص 17 سم
4	بكرا شريط لاصق. 19 مم × 33 م شفاف

المجموعة 1  
الأوقية ا

**الاستخدام:** توفير الأوقية الذكرية والأنثوية في المجتمع وعلى جميع مستويات تقديم الخدمات الصحية.  
**الإرشادات:** ينبغي على العاملين في مجال الصحة والعمال المحليين أن يكونوا قادرين على شرح الاستخدام السليم للأوقية.

**السكان**

**المستهدفون:** الأوقية الذكرية: تعتمد محتويات العبوة على الافتراض أن 20% من سكان المخيم هم من الذكور البالغين (20% من 10.000 = 2000). وأن 20% من هذه المجموعة سيستخدمون الواقي الذكري (أي 400 مستخدم). وأن كل مستخدم سيحتاج إلى 12 وافي ذكري في كل شهر على مدى الأشهر الثلاثة (عدد الأوقية الذكرية =  $3 \times 12 \times 400 = 14.400$ ).

الأوقية الأنثوية: تعتمد محتويات العبوة على الافتراض أن حوالي 25% من السكان المتضررين هم من النساء الناشطات جنسياً (25% من 10.000 = 2500). وأن 1% من هذه المجموعة سيستخدمن الأوقية الأنثوية (أي 25 مستخدمة). وأن كل مستخدمة ستحتاج إلى 6 أوقية في كل شهر على مدى الأشهر الثلاثة (عدد الأوقية =  $3 \times 6 \times 25 = 450$ ).

**المحتويات**

**الجزء أ: الأوقية الذكرية**

14.400	الأوقية الذكرية
2880	زيادة قدرها 20% (تحسباً للهدر)
17.280 (120 في المجموع)	الإجمالي
	المطبوعات
400	نشرات عن استخدام الأوقية الذكرية، بالإنجليزية والفرنسية

**الجزء ب: الأوقية الأنثوية**

450	الأوقية الأنثوية
90	زيادة قدرها 20% (تحسباً للهدر)
540 (3.8 في المجموع)	الإجمالي
	المطبوعات
25	نشرات عن استخدام الأوقية الأنثوية، بالإنجليزية والفرنسية

**ملاحظات**

يمكن طلب الجزأين أ و ب بشكل منفصل وبكميات مختلفة.  
طبقاً لثقافة البلد الذي سيستخدم هذه المجموعة، قد يكون من الضروري تعديل الصور في النشرات.  
لطلبات الأوقية الذكرية ذات الحجم الأصغر، يُرجى الاتصال بفرع خدمات المشتريات بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

المجموعة 2  
الولادة النظيفة، الأفراد

- الاستخدام:** حالات الولادة الفردية النظيفة، في المنزل أو في وحدات الأمومة التي تعاني من قلة التجهيز، ودون قابلات ماهرات.
- الجزء أ:** حالات الولادة الفردية، حزم يتم توزيعها على كل سيدة انقضى من حملها أكثر من 6 أشهر.
- الجزء ب:** معدات للقابلات، طبقاً للوضع والممارسات المحلية، قد تُعطى حقيبة كتف لخمس قابلات تحتوي على مجموعات التوليد النظيف (كما في الجزء أ) وغيرها من البنود.
- الإرشادات:** ينبغي تلقين القابلات حول محتويات المجموعة واستخدامها.
- السكان المستهدفون:** تعتمد محتويات المجموعة على الافتراض أن السكان البالغ عددهم 10.000 نسمة وحيث معدل الولادات الأولي يبلغ 4٪، ستكون هناك 100 حالة ولادة في 3 أشهر، وسيتم استخدام 100 حزمة للسيدات اللاتي يلدن خلال الثلاثة أشهر الأولى، بينما سيتم توزيع 100 مجموعة أخرى على السيدات البالغات 6-9 أشهر من الحمل.

المحتويات

الجزء أ: حالات الولادة الفردية: 200 من العناصر التالية، معبأة على هيئة حزم منفصلة

1	كيس بلاستيك، 18 × 28 سم تقريباً، بقفل تلقائي، للتخلص من المشيمة، ويحتوي على البنود التالية:
1	صابون تواليت، 110 غم تقريباً، مغلف
1	ملاءة سحب المريض بلاستيكية، 100 × 100 سم تقريباً
1	شفرة موسى، أحادية السن، تُستخدم مرة واحدة
3	شريط للحبل السري، 3 مم × 15 سم
2	قطعة قماش/منشفة فطنية، "تترا" 90 غم/2م تقريباً، 100 × 100 سم تقريباً
2	قفازات كشف، متوسطة الحجم، تُستخدم مرة واحدة
	<b>المطبوعات</b>
1	ورقة إرشادات مصورة

الجزء ب: لاستخدام القابلات

5	حقيبة كتف من الفينيل تحمل شعار صندوق الأمم المتحدة للسكان، 360 × 230 × 610 مم تقريباً
5	قفازات كشف، متوسطة الحجم تُستخدم مرة واحدة، عبوة تحتوي على 100
5	كشاف LED قابل لإعادة الشحن
5	مريلة واقية من البلاستيك، قابلة لإعادة الاستخدام
5	عباءة قصيرة واقية من المطر

ملاحظات

يمكن طلب الجزأين أ وب بشكل منفصل وبكميات مختلفة.  
الملابس أو البطانيات لحماية المولود وكذلك المنتجات الصحية الملائمة ثقافياً ينبغي شراؤها محلياً حيثما أمكن.  
المنتجات المحلية غالباً ما تكون أرخص سعراً ومألوفة لدى الأمهات.

**الاستخدام:**

إدارة الآثار المباشرة للعنف الجنسي.

**الإرشادات:**

ينبغي أن يكون العاملون في مجال الصحة مدربين على :

- إجراء اختبارات الحمل;
- وصف وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ. إذا اختارت العميلة ذلك;
- وصف العلاج الظني لأنواع العدوى المنقولة جنسياً والوقاية بعد التعرض (PEP) لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة;
- تقديم المشورة للعمليات وإحالتهم إلى الخدمات النفسية الاجتماعية وخدمات الحماية.

**السكان**

**المستهدفون:**

تعتمد محتويات العبوة على الافتراض أن حوالي 25% من السكان هم من النساء النشطات جنسياً (25% من 10.000 = 2500). وستتعرض 2% منهن للاغتصاب (50 امرأة). بالإضافة إلى اغتصاب 10 أطفال: السكان المستهدفين (5 منهن يقل وزنه عن 30 كيلوغراماً. و 5 يبلغ وزنه 30 كيلوغراماً أو أكثر). وستحتاج 50% من العميلات إلى اختبار الحمل. يجب إعطاء الوقاية بعد التعرض في غضون 72 ساعة من وقوع الاعتداء. ويفترض وجود 30 من البالغات و 8 أطفال (4 منهن بين 10-19 كغم و 4 بين 20-39) ضمن الفترة الزمنية المحددة.

**المحتويات**

الأدوية	
55 عبوة	ليفونورجستريل. أقراص. 1.5 ملغ. (العلاج : جرعة واحدة)
220	* أزيثروميسين. كبسول. 250 ملغ
5	* أزيثروميسين. معلق يتناول بالفم. بتركيز 200 ملغ في 5 مل. زجاجة 15 مل
110	** سيفيكسيم. أقراص. 200 ملغ
10	** سيفيكسيم (في صورة ثلاثي الهيدروكسيل). شراب جاف لتجهيز معلق يتناول بالفم. بتركيز 100 ملغ / 5 مل. زجاجة 30 مل
1800	زيدوفودين. 300ملغ. بالإضافة إلى لميفودين. 150ملغ. قرص مجمع (للبالغين: قرصان/ يومياً لمدة 28 يوماً)
840	زيدوفودين. كبسول. 100 ملغ (انظر بروتوكول العلاج للأطفال)
360	لميفودين. أقراص. 150 ملغ (انظر بروتوكول العلاج للأطفال)
الأجهزة الطبية القابلة للتجديد	
25	اختبار الحمل. درجة حرارة مستقرة
1	كيس (مظروف) بلاستيكي للعقاقير. 15 x 10 سم تقريباً. عبوة 100
المبادئ التوجيهية للعلاج	
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	القائمة المرجعية لرعاية ما بعد الاغتصاب للنساء والرجال والأطفال. PATH. 2010
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	الإدارة السريرية للناجيات من الاغتصاب: دليل لوضع بروتوكولات للاستخدام في حالات اللاجئ والمشردين داخلياً. طبعة منقحة. منظمة الصحة العالمية/مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. 2004
2 بالإنجليزية 2 بالفرنسية	نشرة معلومات مستخدم وسائل منع الحمل لحالات الطوارئ. يتم تعديلها محلياً
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	بروتوكول العلاج الوقائي بعد التعرض ونشرة معلومات المريض يتم تعديلها محلياً

\* أزيثروميسين: للمرضى البالغ وزنهم 45 كغم أو أكثر. العلاج جرعة واحدة قدرها 1 غم (عدد 4 كبسولات 250 ملغ). للمرضى الأقل من 45 كلغ، العلاج هو 20 ملغ/كغم.

\*\* سيفيكسيم: بالنسبة للمرضى البالغ وزنهم 45 كغم أو أكثر. العلاج هو جرعة واحدة 400 ملغ. للمرضى الأقل من 45 كغم. العلاج هو 8 ملغ/كغم.

#### ملاحظات :

قد يتواجد أيضاً الرجال بعد الاغتصاب وينبغي أن يتلقوا العلاج والإحالة المناسبين. للحصول على لقاحات الكزاز والتهاب الكبد، يُرجى مراجعة أقرب مركز صحي تشغيلي.

المجموعة 4  
وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن

الاستخدام: تلبية احتياجات المرأة لوسائل منع الحمل الهرمونية.

- الإرشادات:
- ينبغي أن يكون العاملون في مجال الصحة قد تدربوا على:
  - شرح مزايا وعيوب وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن؛
  - شرح كيفية استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ؛
  - تحديد موانع استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية؛
  - إعطاء الحقن.

السكان

المستهدفون: تعتمد محتويات المجموعة على الافتراض أن 25% من سكان المخيم هم من النساء اللاتي تتراوح

أعمارهن بين 15-49 سنة (25% من 10,000 = 2500)، وأن 15% من هؤلاء النساء يستخدمن موانع الحمل (أي امرأة). منهن:

- 30% يستخدمن وسائل منع الحمل المجمع عن طريق الفم (113 سيدة)؛
- 55% يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الحقن (210 سيدة)؛
- 5% يستخدمن استخدام حبوب منع الحمل البروجيستين فقط (20 سيدة)؛
- في كل شهر، 5% قد يطلبن وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ (20 سيدة)؛
- 5% يستخدمن اللوالب - انظر المجموعة 7.

المحتويات:

الأدوية	
إيثينيل إستراديول 0.03 ملغ. بالإضافة إلى ليفونورجستريل، 0.15 ملغ. قرص مجمع	375
شريط واحد: لدورة واحدة (113 سيدة × عدد 3 دورات + 10 ٪ للهدرا)	
ليفونورجستريل، أقراص، 1.5 ملغ. (لمنع الحمل في حالات الطوارئ)	60
ليفونورجستريل، أقراص، 0.03 ملغ. شريط واحد لدورة واحدة (20 سيدة × عدد 3 دورات)	60
خلات الميديروكسي بروجستيرون، حقن مدخرية، 150 ملغ/مل، قنينة 1 مل	300
غلوكونات الكلورهيكسيدين محلول مركز، 5 ٪، زجاجة 1000 مل	3
<b>الأجهزة الطبية القابلة للتجديد</b>	
سرنجة لور، 2 مل، معقمة، تستخدم مرة واحدة	300
إبرة لور قياس القطر 21 (0.8 × 40 مم)، معقمة، تستخدم مرة واحدة	600
صوف قطني، لفة 500 غم، غير معقمة	4
صندوق السلامة، للسرنجات والإبر المستعملة، سعة 5 لترات	3
<b>المبادئ التوجيهية للعلاج</b>	
تنظيم الأسرة، كتيب عالمي لمقدمي الخدمة، الفصول 1-4	1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية

ملاحظات

ينبغي إعادة طلب وسائل منع الحمل بعد تقييم احتياجات الصحة الإنجابية. تفضل الطلبيات بالجملة، لأنها أقل كلفة، وينبغي أن تتم من خلال القنوات المعتادة أو فرع خدمات المشتريات بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

المجموعة 5  
علاج العدوى المنقولة جنسياً

- الاستخدام:** لعلاج العدوى المنقولة جنسياً لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض.
- الإرشادات:** ينبغي أن يكون العاملون في مجال الصحة قد تربوا على:
- تشخيص وعلاج العدوى المنقولة جنسياً وفقاً للنهج المتلازمي؛
  - شرح أهمية علاج الشريك الجنسي؛
  - التشجيع استخدام الواقي الذكري و الأئثوي وشرح كيفيةته.

**السكان**

**المستهدفون:** تعتمد محتويات المجموعة على الافتراض أن 50% من السكان المتضررين هم من البالغين (50% من 10.000 = 5000)، وأن 5% من هؤلاء (250 شخص) لديهم أمراض منقولة جنسياً. منهم:

- 20% لديهم متلازمة القرحة التناسلية (50 شخصاً)؛
- 50% لديهم متلازمة النجيج الإحليلي (125 شخصاً)؛
- 30% لديهم متلازمة النجيج المهبلي (75 شخصاً).

لكل متلازمة. يُفترض أن هناك 25 مريضاً آخرين من الأطفال (10 تحت 30 كغم و15 يبلغ وزنهم 45-30 كغم).

**المحتويات**

الأدوية	
<b>متلازمة القرحة التناسلية</b>	
البنزاثين بنزيل بينسيلين، مسحوق لتحضير محلول للحقن، قارورة (تعادل 2.4 مليون وحدة من بنزيل بينسيلين)	65
البنزاثين بنزيل بينسيلين، مسحوق لمحلول الحقن، قنينة (تعادل 1.2 مليون وحدة من بنزيل بينسيلين)	10
ماء للحقن، أمبولات 10 مل	75
* أزيثروميسين، كبسول، 250 ملغ	240
* أزيثروميسين، معلق، 200ملغ/5مل، زجاجة 15 مل	10
غلوكونات الكلورهيكسيدين، محلول مركز، قنينة 5 ٪، 1000 مل	3
<b>متلازمة النجيج الإحليلي</b>	
** سيفيكسيم، أقراص، 200 ملغ	270
** سيفيكسيم (في صورة ثلاثي الهيدروكسيل)، شراب جاف لمعلق عن طريق الفم، 100 ملغ/5 مل، زجاجة 30 مل	20
* أزيثروميسين، كبسول، 250 ملغ	540
* أزيثروميسين، معلق، 200 ملغ/5 مل، زجاجة 15 مل	10
<b>متلازمة النجيج المهبلي (العلاج التهاب المهبل وعنق الرحم)</b>	
ميترونيدازول، أقراص، 250 ملغ (جرعة واحدة من 8 أقراص، أو قرصين مرتين يومياً لمدة 7 أيام)	2000
كلوتريمازول، أقراص مهبلية، 500 ملغ (جرعة واحدة)	100
** سيفيكسيم، أقراص، 200ملغ	200
** سيفيكسيم (في صورة ثلاثي الهيدروكسيل)، شراب جاف لتجهيز معلق يتناول عن طريق الفم، بتركيز 100 ملغ/5 مل، زجاجة 30مل	10
* أزيثروميسين، كبسول، 250 ملغ	340
* أزيثروميسين، معلق، 200 ملغ/5 مل، زجاجة 15 مل	10
<b>الأوقية</b>	
الأوقية الذكرية (20 في المجموع)	2880
الأوقية الأنثوية (3 لكل امرأة)	90

الأجهزة الطبية القابلة للتجديد	
75	سرنجة، لور، 5 مل معقمة، تستخدم مرة واحدة
150	إبرة لور، قياس القطر 21 (0.8 × 40 مم)، معقمة، تُستخدم مرة واحدة
3	صوف قطني، لفة 500 غم، غير معقم
4	صندوق السلامة، للحقن والإبر المستعملة، سعة 5 لترات
10	كبس (مظروف) بلاستيكي، للأدوية، 10 × 15 سم، عبوة 100
المطبوعات	
100 بالإنجليزية 100 بالفرنسية	نشرة عن استخدام الواقي الذكري
60	نشرة عن استخدام الواقي الأنثوي، بعدة لغات
المبادئ التوجيهية للعلاج	
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	العدوى المنقولة جنسياً وعدوى الجهاز التناسلي الأخرى، دليل الممارسات الأساسية، جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2005.
1 بالإنجليزية/ بالفرنسية	لوحة جدارية عن العلاج التلازمي للأمراض المنقولة جنسياً

\* أزينثروميسين: بالنسبة للمرضى الذين يبلغ وزنهم 45 كغم أو أكثر، العلاج جرعة واحدة 1 غم (عدد 4 كبسولات 250 ملغ)، للمرضى الأقل من 45 كلغ، العلاج هو 20 ملغ/كغم.

\*\* سيفيكسيم: بالنسبة للمرضى البالغين 45 كغم أو أكثر، العلاج هو جرعة واحدة 400 ملغ، للمرضى الأقل من 45 كغم، العلاج هو 8 ملغ/كغم.

#### ملاحظات

ينبغي إعادة طلب الأدوية بعد تقييم الاحتياجات في مجال الصحة الإيجابية، وينبغي أن تستند المضادات الحيوية المطلوبة إلى البروتوكول الوطني لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً. قد تكون المضادات الحيوية في البروتوكول الوطني مختلفة عن تلك الموجودة في هذه المجموعة. لا تتضمن هذه المجموعة اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، وينبغي تقديم اختبار فيروس نقص المناعة البشرية كجزء من برنامج لتقديم المشورة والفحص الطوعي، وليس في عزلة.

الفئة 2

المجموعات التي تلبي احتياجات 30 ألف شخص لمدة 3 أشهر

المجموعة 6	المساعدة في الولادة السريرية (أ و ب)
المجموعة 7	لوالب رحيمة
المجموعة 8	إدارة الإجهاض التلقائي ومضاعفات الإجهاض
المجموعة 9	خياطة التمزق (عنق الرحم والمهبل) والفحص المهبلي
المجموعة 10	التوليد بشفط الجنين

المجموعة 6  
المساعدة في الولادة السريرية  
الجزء أ: المعدات القابلة لإعادة الاستخدام

هذه المجموعة مخصصة للاستخدام في المرافق الصحية، مع المجموعة 6 الجزء ب.  
الاستخدام: - لإجراء الولادات الطبيعية:

- لخياطة بضع الفرج والتمزق العجاني تحت التخدير الموضعي:
- لتحقيق الاستقرار للمريضات اللاتي تعانين من مضاعفات الولادة (مثل تسمم الحمل أو النزف) قبل الإحالة الى مستوى أعلى من الرعاية.

الإرشادات: للاستخدام من قبل الأفراد المدربين: القابلات والممرضات من ذوات مهارات القبالة والأطباء.

المحتويات

الأجهزة الطبية، المعدات	
1	مقياس ضغط الدم اللاسائلي للكبار
1	سماعة الطبيب كاملة للأذنين
2	سماعة الطبيب للجنين لإذن واحدة
2	حوض طبي منحني على شكل الكلى من الفولاذ المقاوم للصدأ، 825 مل تقريباً
4	ميزان حرارة سريري رقمي. 32-43 درجة مئوية
2	فرشاة يد بلاستيكية للكحت
2	عاصبة مطاطية، 75 سم تقريباً
1	جهاز تنفس يدوي للرضع والأطفال
1	درج أدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ، 225 x 125 x 50 مم تقريباً. مع غطاء
2 طاقم	طاقم الولادة (اليونيسيف 2007 المرجع : 9910003)
2	مقص، مايو كلينيك، 140 مم، مقوس، ناحيتين غير حادثين (القطع الحبل السري)
2	مقص أمراض النساء، 200 مم، مقوس، ناحيتين غير حادثين (البضع الفرج)
4	ملقط الشريان، كوشر، 140 مم، مستقيم
2 مجموعة	مجموعة الخياطة (استناداً إلى مجموعة اليونيسيف للخياطة، 2007 المرجع : 9910004)
2	مقص ديفر، 140 مم، مقوس، ناحية حادة والأخرى غير حادة
2	حامل الإبرة، مايو كلينيك-هيفار، 180 مم، مستقيم
2	ملقط، الأنسجة، معباري، 145 مم، مستقيم
2	ملقط الشريان، كوشر، 140 مم، مستقيم
1 مجموعة	مجموعة التعقيم (اليونيسيف 2007 المرجع : 9908200)
1	موقد كبروسين بشعلة واحدة بالضغط
1	معقم البخار، 39 لتر تقريباً، بإمكانية/الوصول
1	الموقت، 60 دقيقة
2	أوعية التعقيم، قطر 165 مم تقريباً
2	أوعية التعقيم، قطر 260 مم تقريباً
2	أوعية التعقيم، قطر 290 مم تقريباً
1	ملقط الشريان، كوشر، 140 مم، مستقيم
الإضاءة	
1	كشاف أمامي LED يعمل بالبطارية
1	مصباح كبروسين للعواصف + جوارب إضافية

## المجموعة 6

### المساعدة في الولادة السريرية

الجزء ب: الأدوية والأدوات المعدة للاستخدام لمرة واحدة

هذه المجموعة مخصصة للاستخدام في المرافق الصحية، مع المجموعة 6 الجزء أ.

الاستخدام:

- لإجراء الولادات الطبيعية؛
- لخباطة بضع الفرج والتمزق العجاني تحت التخدير الموضعي؛
- لتحقيق الاستقرار للمريضات اللاتي تعانين من مضاعفات الولادة (مثل تسمم الحمل أو النزف) قبل الإحالة الى مستوى أعلى من الرعاية.

الإرشادات: للاستخدام من قبل الأفراد المدربين: القابلات والممرضات من ذوي مهارات القبالة والأطباء.

السكان

المستهدفون: تعتمد محتويات المجموعة على الافتراض أن معدل الولادات الأولي للسكان المتضررين يبلغ نسبة

4%. وأن هناك 300 حالة ولادة ستحدث في 3 أشهر (4% من 30.000 = 1200 ولادة سنويا/4 أشهر = 300 حالة ولادة). إذا كان 15% منها تتم في المرفق الصحي. ستكون هناك حاجة إلى إمدادات لأجل 45 ولادة. ويقدر عدد النساء الحوامل في تعداد السكان في أي وقت بنحو 300 في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. و 300 في الأشهر الثلاثة الثانية و 300 في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

المحتويات

الأدوية	
أموكسيسيلين، أقراص. 250 ملغ	5000
ميثرونيدازول، أقراص. 250 ملغ	2100
كبريتات الحديدوز + حمض الفوليك، أقراص. 200 ملغ + 0.4 ملغ. علبة 1000	5
هيدروكلوريد التتراسيكلين، مرهم عين، 1%. أنبوب 5 غم	6
ليدوكائين هيدروكلوريد، محلول للحقن، 10 ملغ/مل (1%)، وأمبوله 20 مل	20
* الأوكسيتوسين، حقن. 10 وحدة دولية/مل. أمبوله 1 مل	50
كلوريد الصوديوم، محلول للتسريب، 0.9% (متساوي التوتر)، زجاجة 1 لتر + طاقم التسريب، معقم يُستخدم مرة واحدة	15
الجلوكوز، محلول للتسريب، 5% (متسق الضغط التناضحي)، زجاجة 1 لتر + طاقم التسريب، معقم يُستخدم مرة واحدة	20
ديكستران 70، محلول للحقن، 6%. زجاجة 500 مل + طاقم التسريب، معقم، يُستخدم مرة واحدة	20
سلفات المغنيزيوم، محلول للحقن، 500 ملغ/مل. أمبوله 10 مل	10
جلوكونات الكالسيوم (أحادي الهيدرات)، محلول للحقن، 100 ملغ/مل. أمبوله 10 مل	5
ماء للحقن، أمبوله 10 مل	20
غلوكونات الكلورهيكسيدين، محلول مركز، 5%. زجاجة، 1000 مل	12
أجهزة طبية، قابلة للتجديد	
مشبك للحبل السري، معقم، يُستخدم مرة واحدة	100
قنية وريدية قصيرة، قياس القطر 20، معقمة تُستخدم مرة واحدة	25
سرنجة لور، 10 مل، معقمة، تُستخدم مرة واحدة	50
سرنجة لور، 2 مل، معقمة، تُستخدم مرة واحدة	100
إبرة لور، قياس القطر (0.8 × 40 مم)، معقمة، تُستخدم مرة واحدة	200
** حفنة تغذية، طرف القسطرة، 60/50 مل، معقمة، تُستخدم مرة واحدة	10
قفازات جراحية، مقاس 8، معقمة تُستخدم مرة واحدة، زوج	30
قفازات جراحية، مقاس 7، معقمة تُستخدم مرة واحدة، زوج	30

5	قفازات أمراض النساء، مقياس متوسط، معقمة تُستخدم مرة واحدة، زوج
3	قفازات الكشف، مقياس متوسط، تُستخدم مرة واحدة، علبة 100
3	غرز اصطناعية، قابلة للامتصاص، (2/DEC3) إبرة 3/8، 30 مم، مستديرة، معقمة، تُستخدم مرة واحدة، علبة 12
50	مستخرج المخاط، 20 مل، معقم، يُستخدم مرة واحدة
10	أنبوب، شفط، CH10، طول 50 سنتيمتر، طرف مخروطي، معقم، يُستخدم مرة واحدة
10	أنبوب، شفط، CH14، طول 50 سنتيمتر، طرف مخروطي، معقم، يُستخدم مرة واحدة
20	القسطرة، CH12 لمجرى البول، معقمة، تُستخدم مرة واحدة
50	لفة شاش، 10 × 10 سم، معقمة، تُستخدم مرة واحدة، عبوة تحتوي على 5
3	صوف قطني، لفة 500 غم، غير معقم
5	شريط لاصق، أكسيد الزنك، 2.5 سم × 5 سم
30	قطعة صابون تواليت، 110 غرام تقريباً، مغلفة
6	صندوق السلامة للسررنجات والإبر المستعملة، سعة 5 لترات
2	نظارات السلامة، المقياس العادي، تُستخدم مرة واحدة
10	كيس (مظروف) بلاستيكي للأدوية، 10 × 15 سم تقريباً، رزمة 100
2	مريلة واقية من البلاستيك، قابلة لإعادة الاستخدام
2	ملاءة سحب المريض من البلاستيك، 90 × 180 سم تقريباً
3	شرائط اختبار البروتين في البول، علبة 50
300	مؤشر، نقطة مراقبة الوقت والبخار ودرجة الحرارة
10	بطارية بالخلية الجافة والقلوية، 1.5، AAA فولت، للكشاف الأمامي
	<b>الأدوات المكتتبية</b>
2	دفتر بحجم A4 مسطر، 100 صفحة
10	قلم جاف أزرق
1	حقيبة متعددة الأغراض من الفينيل، 360 × 230 × 610 مم تقريباً
	<b>المبادئ التوجيهية للعلاج</b>
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	الوقاية من الإصابة، كتيب مرجعي لمقدمي الرعاية الصحية، إنجنندر هيلث، 2001.
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	المبادئ التوجيهية لإدارة النساء اللاتي تعانين من مقدمات الارتعاج والارتعاج، جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2006.
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	عملية تعقيم الأدوات، لوحة حائطية، مقتبسة من إنجنندر هيلث، باث 2010

\* يجب أن يبقى الأوكسيتوسين بارداً أثناء النقل والتخزين، ولذلك تتم تعبئته وإرساله بشكل منفصل.

\*\* يمكن استخدام المحاقن المعقمة 60/50 في طرف القسطرة لأغراض التنشيف/الشفط في البلعوم أو القصبة الهوائية.

#### ملاحظات

يمكن طلب المجموعة 6 أ و ب كل على حدة وبكميات مختلفة  
يمكن الحصول على نسخ ضوئية من خلال تصوير النموذج في Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings، مراجعة 2010 للمراجعة الميدانية، صفحة 143  
لا تتضمن هذه المجموعة الديازيبام نظراً لاشتراطات ترخيص الاستيراد، ينبغي شراء هذا الدواء محلياً (10 قنينات للحن، 5 ملغ/مل، 2 مل).  
ينبغي شراء الملابس أو البطانيات لحماية المولود وكذلك المنتجات الصحية الملائمة ثقافياً محلياً حيثما أمكن.  
المنتجات المحلية غالباً ما تكون أرخص سعراً ومألوفة لدى الأمهات.

المجموعة 7  
اللولب الرحمية

- الاستخدام:  
- إبلاج اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل;  
- إزالة اللولب;  
- توفير العلاج بالمضادات الحيوية الوقائية.

الإرشادات: للاستخدام من قبل العاملين المدربين في مجال الصحة.

السكان

المستهدفون: تعتمد محتويات المجموعة على الافتراض أن 25% من السكان هم من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة (25% من 30.000 = 7500). وأن 15% من هؤلاء النساء يستخدمن وسائل منع الحمل (1125 امرأة). وأن 5% منهن ستختار اللولب (60 امرأة).

المحتويات

الأدوية	
لولب رحمي نحاسي 380 T - A	90
الدوكسيسيكليين (هيدروكلوريد)، أقراص، 100 ملغ	200
غلوكونات الكلورهيكسيدين، محلول مركز، 5٪، زجاجة 1000 مل	3
<b>الأجهزة الطبية القابلة للتجديد</b>	
كيس (مظروف) بلاستيكي للأدوية، 10 × 15 سم تقريباً، رزمة 100	1
قفازات جراحية، مقاس 8، معقمة تُستخدم مرة واحدة، زوج	50
قفازات جراحية، مقاس 7 معقمة تُستخدم مرة واحدة، زوج	50
لفة شاش مضغوط، 10 × 10 سم، معقمة، تُستخدم مرة واحد، لفة 5	200
<b>الأجهزة الطبية والمعدات</b>	
<b>طاقم تثبيت وإزالة اللولب</b>	
منظار مهبلي، غريفز، 95 × 35 سم	2
منظار مهبلي، غريفز، 115 × 35 سم	1
ملقط للغيار، شبيرون، 25 سم	1
ملقط شرياني، بين/روش، 220 م، مستقيم	2
مسبار رحمي، مارتين، 320 م	3
ملقط رحمي، دوبليه، 280 م، مقوس	1
مقص أمراض النساء، 200 م، مقوس ناحيتين غير حادتين	1
وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ، 180 مل تقريباً	1
حوض طبي منحني على شكل الكلى من الفولاذ المقاوم للصدأ، 825 مل تقريباً	2
صينية أدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ، 320 × 200 × 80 م، بغطاء	1

ملاحظة

لا تشمل هذه المجموعة معدات تعقيم، وهي عادةً ما تُطلب مع المجموعة 6 أ (المساعدة في الولادة السريرية)، والتي تتضمن وحدة التعقيم البخار. عند طلب المجموعة 7 من دون المجموعة 6، ينبغي شراء معدات التعقيم بشكل منفصل.

**الاستخدام:** لعلاج المضاعفات الناجمة عن الإجهاض التلقائي. والإجهاض المتعمد غير المأمون. بما في ذلك تعفن الدم والتفرغ غير المكتمل والنزيف.

**الإرشادات:** يجب استخدام المعدات فقط من قبل أفراد الصحة المدربين على إدارة حالات الإجهاض التلقائي ومضاعفات الإجهاض. بما في ذلك إجراء تفرغ الرحم.

**السكان**

**المستهدفون:** تعتمد محتويات هذه المجموعة على أساس الافتراض بأن 20% أخرى من النساء الحوامل قد يتعرضن للإجهاض التلقائي أو يعانين من مضاعفات الإجهاض غير المأمون (20% من 300 = 60).

**المحتويات**

الأدوية	
1000	الدوكسيسيسكلين هيدروكلوريد. أقراص. 100 ملغ
2000	ميثرونيدازول. أقراص. 250 ملغ.
180	* ميسوبروستول. أقراص. 0.2 ملغ (200 مايكروغرام)
2	** أقراص ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم. تحتوي على 1.67 غرام NaDCC. علبه 2
120	إيبوبروفين. أقراص. 400 ملغ. 2 قرص لكل امرأة (قرص قبل الخروج. قرص بالمنزل)
100	*** الأوكسيتوسين. حقن. 10 وحدة دولية/مل. أمبولة 1 مل
50	ليدوكائين هيدروكلوريد. حقن. 10 مل/مل (1%). أمبولة 20 مل
30	سلفات الأتروبين. محلول للحقن. 1 ملغم/مل. أمبولة 1 مل
10	ماء للحقن. أمبولة 10 مل
3	غلوكونات الكلورهيكسيدين. محلول منظف. و 4% (هيبيسكراب). زجاجة 500 مل
10	غلوكونات الكلورهيكسيدين. محلول مركز. 5%. زجاجة 1000 مل
الأجهزة الطبية القابلة للتجديد	
50	قفازات جراحية. مقاس 8. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. زوج
50	قفازات جراحية. مقاس 7. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. زوج
1	قفازات الكشف. مقاس متوسط. تُستخدم مرة واحدة. علبه 100
100	سرجة. لور. 10 مل معقمة. تُستخدم مرة واحدة
200	سرجة. لور. 2 مل معقمة. تُستخدم مرة واحدة
300	إبرة لور. قياس القطر 21(0.8 × 40 مم). معقمة. تُستخدم مرة واحدة
240	لفة شاش. 10 × 10 سم. معقمة. تُستخدم مرة واحد. لفة 5
1	كيس (مظروف) بلاستيكي. للأدوية. 10 × 15 سم. عبوة 100
3	صندوق السلامة. للسرجات والإبر المستعملة. سعة 5 لترات
المطبوعات	
60 بالإنجليزية 60 بالفرنسية	نشرة للنساء: معلومات لمرحلة ما بعد العملية. كيف تعتنين بنفسك.
المبادئ التوجيهية للعلاج	
1	Gynecological aspiration system, for uterine aspiration/uterine evacuation in obstetrics and gynecology patients. تشابل هيل. نورث كارولاينا. آيباس. بعدة لغات

1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	Performing uterine evacuation with the Ipas MVA Plus® Aspirator and Ipas EasyGrip® cannulae: instructional booklet. نورث كارولاينا. آيباس 2008.
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	التشغيط اليدوي بالتخلية. مأخوذ من: Managing complications in pregnancy and childbirth. جنيف. منظمة الصحة العالمية. 2000.
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	Misoprostol for treatment for incomplete abortion and miscarriage. Instructions for use. مشاريع جنوبيتي للصحة. 2008.
<b>الأجهزة الطبية، المعدات</b>	
<b>مجموعة التشغيط اليدوي بالتخلية (MVA) (مأخوذة عن مجموعة إيباس عدد IA18 2)</b>	
4	مجموعة MVA Plus سيليكون 2 سم مكعب
2	طاقم ملحقات لمجموعة MVA Plus، يشمل عدد (1) حلقة على هيئة O، عدد (1) مغلاق عنقي، عدد (1) غطاء، عدد (1) بالون سيليكون 2 سم مكعب
6	بالونات سيليكون 2 سم مكعب معبأة في أكياس يحتوى كل منها على 10
8	قنية، إيزي غريب، 6 م، قاعدة مدمجة
8	قنية، إيزي غريب، 7 م، قاعدة مدمجة
8	قنية، إيزي غريب، 8 م، قاعدة مدمجة
4	قنية، إيزي غريب، 9 م، قاعدة مدمجة
4	قنية، إيزي غريب، 10 م، قاعدة مدمجة
4	قنية، إيزي غريب، 12 م، قاعدة مدمجة
4	موسعات دنيسون البوليمر، طاقم 5
<b>مجموعة التوسيع والتشغيط (مأخوذة عن اليونيسيف مرجع: 9910002)</b>	
1	سلة التعقيم، 120 × 250 × 60 م تقريباً
1	ملقط تشيرون للغيار، 250 م
1	ملقط ميوسو الرحمي، 240 م، مقوس
1	مباعد مهبلي، دويان، 45 × 85 م
1	مباعد مهبلي، أوفارد، 38 × 80 م
1	ملعقة جراحية للرحم، سيمون، 6 م، حادة
1	مكشطة رحمية، سيمز، 7 م، حادة
1	مكشطة رحمية، سيمز، 8 م، كليلة
1	مكشطة رحمية، سيمز، 9 م، حادة
1	مكشطة رحمية، سيمز، 12 م، حادة
1	مسبار رحمي، مارتن، 320 م
1	منظار مهبلي، غريفز، 95 × 35 م
1	وعاء من الفولاذ الذي لا يصدأ، 180 مل

\* ميسوبروستول: علاج الإجهاض غير المكتمل هو جرعة واحدة 600 ميكروغرام عن طريق الفم، أو جرعة واحدة 400 ميكروغرام تحت اللسان

\*\* NaDCC: كل قرص فوار يطلق 1غم من الكلور المتاح عندما يذوب في الماء.

\*\*\* يجب أن يبقى الأوكسيتوسين بارداً أثناء النقل والتخزين. ولذلك يجباً وبرسلاً بشكل منفصل.

#### ملاحظات

ينبغي التشجيع على التشغيط بالتخلية (اليدوي) بدلاً من بمكشط حاد.

لا تشمل هذه المجموعة معدات تعقيم، وهي عادةً ما تُطلب مع المجموعة 6 أ (المساعدة في الولادة السريرية)، والتي تتضمن وحدة التعقيم بالبخار. عند طلب المجموعة 8 من دون المجموعة 6 أ، ينبغي شراء معدات التعقيم بشكل منفصل.

المجموعة 9  
 خياطة التمزيق (عنق الرحم والمهبل)  
 والفحص المهبل

الاستخدام:

- لخياطة تمزيقات عنق الرحم والمهبل العالية.
  - فحص النساء اللاتي تعرضن لاعتداء جنسي.
- الإرشادات: يقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين في مجال الصحة المدربين: الأطباء والقابلات أو الممرضات من ذوات مهارات القبالة.
- السكان المستهدفون: تعتمد محتويات المجموعة على الافتراض أن 15% من النساء اللاتي يلدن سيكن بحاجة إلى خياطة (15% من 300 = 45 امرأة على مدى 3 أشهر).

المحتويات

الأدوية	
غلوكونات الكلورهيكسيدين. محلول مركز. 5%. زجاجة 1000 مل	4
بوليفيدون اليود. محلول للاستخدام الجليدي. 10%. زجاجة 500 مل	2
هلام التزييق المهبلي/جل الاستكشاف. 100 غم تقريباً	1
<b>الأجهزة الطبية القابلة للتجديد</b>	
غرز اصطناعية. قابلة للامتصاص. DEC4 (1) إبرة 3/8، 36 م، مثلثة، معقمة. تُستخدم مرة واحدة. علبة 12	6
غرز اصطناعية. قابلة للامتصاص. DEC3 (2/0) إبرة 1/2، 30 م، مستديرة. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. علبة 12	5
غرز اصطناعية. قابلة للامتصاص. DEC3 (2/0) إبرة 3/8، 50 م، مستديرة. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. علبة 12	6
لفة شناش. 10 × 10 سم، معقمة. تُستخدم مرة واحد. لفة 5	80
قفازات جراحية. مقاس 8. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. زوج	40
قفازات جراحية. مقاس 7. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. زوج	40
قفازات كنف. متوسطة الحجم تُستخدم مرة واحدة. عبوة تحتوي على 100	2
<b>الأجهزة الطبية. المعدات</b>	
<b>طاقم الأدوات الجراحية، للكشف/الخياطة، المهبل/العنقي (اليونيسيف المرجع: 9910006)</b>	
مقص. مايو كلينيك. 170 م، مقوس ناحيتين غير حادتين	1
حامل الإبرة. مايو كلينيك-هيفار. 180 م، مستقيم	1
مباعد مهبلي. دويان. 45 × 85 م	2
منظار مهبلي. غريفيز. 75 × 20 م	1
منظار مهبلي. غريفيز. 95 × 35 م	1
منظار مهبلي. غريفيز. 115 × 35 م	1
ملقط للغيار تشيرون. 250 م	2
صينية أدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ. 320 × 200 × 80 م تقريباً. مع غطاء	1

ملاحظات

في حالات الاعتداء الجنسي. استخدم هذه المجموعة مع المجموعة 3 (علاج ما بعد الاغتصاب). إذا أوصي باستخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ أو الانتفاء بعد التعرض للفيروس. أو العلاج بالمضادات الحيوية.

لا تشمل هذه المجموعة معدات تعقيم. وهي عادةً ما تُطلب مع المجموعة 6 أ (المساعدة في الولادة السريرية). والتي تتضمن وحدة التعقيم البخار. عند طلب المجموعة 9 من دون المجموعة 6أ. ينبغي شراء معدات التعقيم بشكل منفصل.

المجموعة 10  
التوليد بشفط الجنين

الاستخدام: للإجراء تخلية بالشفط يدوياً.  
الإرشادات: يقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين المهرة في مجال الصحة الذين تم تدريبهم على تقديم المساعدة في التوليد مع التخلية بالشفط.

السكان  
المستهدفون: الولادات التي تتطلب المساعدات في التخلية بالشفط.

المحتويات

الأجهزة الطبية، المعدات	
	وحدة التخلية بالشفط (اليونيسيف 2007 المرجع: 0791500)
1	وحدة التخلية بالشفط، ببرد، يدوية، المجموعة الكاملة
المبادئ التوجيهية للعلاج	
1	Procedure for Use of Vacuum Extractor in Assisted Vaginal Delivery, لوحة جدارية، مأخوذة من منظمة الصحة العالمية، باث، 2010

الفئة 3

المجموعات المستخدمة على مستوى الإحالة/الجراحة على مستوى التوليد  
لتلبية احتياجات 150 ألف شخص لمدة 3 أشهر

مجموعة مستوى الإحالة للصحة الإيجابية (أ و ب)	المجموعة 11
مجموعة نقل الدم	المجموعة 12

المجموعة 11  
مجموعة مستوى الإحالة للصحة الإيجابية  
الجزء أ: المعدات القابلة لإعادة الاستخدام

- تستخدم هذه المجموعة مع المجموعة 11 الجزء ب.
- لإجراء العمليات القيصرية وغيرها من التدخلات الجراحية في الولادة.
  - لإنعاش الأمهات والرضع.
  - لتوفير العلاج عن طريق الوريد (على سبيل المثال لحمى النفاس أو تسمم الحمل).

الإرشادات: يقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين في مجال الصحة المهرة في توفير الرعاية الشاملة لحالات الولادة الطارئة، بما في ذلك إجراء الجراحة للتوليد.

المحتويات

الأجهزة الطبية، المعدات	
	صندوق، باطني، 58 أداة (أطباء بلا حدود 2010 المرجع: KSURBBD58S)
1	سلة أدوات للتعقيم، سلكية، 400 x 200 x 90 م
4	مشبك منشفة، باكهاوس، 120 م
4	ملقط شرياني، بنغوليا، 200 م، مقوس ومسفن
2	ملقط شرياني، كرافورد (كولر)، 240 م، مقوس
10	ملقط شرياني، كيلي، 140 م، مقوس
6	ملقط شرياني، هالستيد موسكينو، 125 م، مقوس
2	ملقط شرياني كوشر، 140 م، 1 x 2 سن، مقوس
2	ملقط شرياني كوشر، 140 م، 1 x 2 سن، مستقيم
1	ملقط شرياني ميكستر، 140 م، حساس للغاية
1	ملقط شرياني ميكستر، 230 م، حساس
1	ملقط للغيار، معياري، 145 م، مستقيم
1	ملقط للغيار، معياري، 250 م، مستقيم
1	ملقط الأمعاء، مشبك، دويان، 230 م، مقوس
1	ملقط الأمعاء، مشبك، دويان، 230 م، مستقيم
2	ملقط بريثوني، فور، 210 م، مقوس قليلا
2	ملقط الأنسجة، دوفال، 230 م
1	ملقط الأنسجة، معياري، و 145 م، مستقيم
1	ملقط، الأنسجة، معياري، 250 م، مستقيم
1	وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ، 500 مل
1	حامل الإبرة، بيبي-كرايل-وود، 150 م، حساس
1	حامل الإبرة، مايو كلينيك-هيجار، 180 م، مستقيم
1	مباعد باطني، غوسيه، 2 ثنفرة، 58 م عمق + الثنفرة المركزية 57 م x 60 م
1	مباعد فارابوف، مزدوج الطرف، 150 م، زوج
1	مقبض مشرط، رقم 4، معياري
1	مقبض مشرط، رقم 4، طويل
1	مقص ميتزيموم/نيلسون، 180 م، مقوس، ناحيتين غير حادتين

1	مقص ميتزيمبوم/نيلسون، 230 مم مقوس. ناحيتين غير حادثين
1	مقص. مايو كلينيك، 170 مم مقوس
1	مقص. مايو كلينيك، 230 مم مقوس
2	ملعقة. مبادئ مطاطي، طبع، 27 مم x 250 مم
1	أنبوب شفط. يانكور، 280 مم
	مجموعة تشريح الجنين (اليونيسيف المرجع: 9910007)
1	مشداح القحف، براون، 420 مم
1	مخزن، سميلي، 250 مم
1	مقص أمراض النساء، 200 مم مقوس. ناحيتين غير حادثين
1	خطاف إزالة الرؤوس، براون، 310 مم
	معدات التعقيم
1	وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ، 180 مل تقريباً
1	ملقط للغيار، تشيرون، 250 مم
	مجموعة الإنعاش الأساسية (اليونيسيف المرجع: 9908400)
1	مضخة شفط تعمل بالقدم
1	جهاز تنفس يدوي للرضع/الأطفال، مجموعة
1	جهاز تنفس يدوي للبالغين، مجموعة

#### ملاحظات

لا تشمل هذه المجموعة معدات التعقيم، إذا كان جهاز التعقيم البخار (الأوتوكلاف) غير متوفر في المستشفى. قم بطلب جهاز من خلال قنوات الشراء المعتادة أو من خلال فرع خدمات المشتريات بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

المجموعة 11  
مجموعة مستوى الإحالة للصحة الإيجابية  
الجزء ب: الأدوية والمعدات للمعدة للاستخدام مرة واحدة

تستخدم هذه المجموعة مع المجموعة 11 الجزء أ.

- الاستخدام:
- لإجراء العمليات القيصرية وغيرها من التدخلات الجراحية في الولادة.
  - لإنعاش الأمهات والرضع.
  - لتوفير العلاج عن طريق الوريد (على سبيل المثال لحمى النفاس أو تسمم الحمل).

الإرشادات: يقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين في مجال الصحة المهرة في توفير الرعاية الشاملة لحالات الولادة الطارئة، بما في ذلك إجراء الجراحة للتوليد.

السكان

المستهدفون: من بين السكان البالغ تعدادهم 150 ألف نسمة. وحيث معدل الولادات الأولي يبلغ 4٪، ستكون هناك 6000 حالة ولادة في 12 شهرا، أو 1500 حالة ولادة في 3 أشهر. ومن المفترض أن حوالي 5٪ منها ستنتطلب عمليات قيصرية (5٪ من 1500 = 75). وهناك تقريبا 30 امرأة أخرى ستحتاج إلى الرعاية في حالات الطوارئ.

المحتويات

الأدوية	
ميثرونيدازول، أقراص. 250 ملغ	1000
أموكسيسيلين، أقراص. 500 ملغ	2000
الباراسيتامول، أقراص. 500 ملغ	2000
الكينين (في صورة سلفات أو ثنائي السلفات)، أقراص. 300 ملغ	1000
الدوكسيسيسيكليين (في صورة هيدروكلوريد)، أقراص. 100 ملغ	1400
هيدروكلوريد التتراسايكلين، مرهم العين. 1٪	30
أمبيسيلين (في صورة ملح صوبيوم)، مسحوق لحلول للحقن، قنينة 1 غم	400
جنتاميسين (في صورة سلفات)، محلول للحقن. 04 ملغ/مل، قنينة 2 مل	1050
ماء للحقن وأمبولة 10 مل	500
ميثرونيدازول، عن طريق التسريب في الوريد. 5 ملغ/مل، كيس 100 مل	200
الإرغومتريين ماليات، حقن. 0.2 ملغ/مل، أمبولة 1 مل	200
* الأوكسيتوسين، حقن. 10 وحدة دولية/مل، أمبولة 1 مل	200
جلوكونات الكالسيوم (أحادي الهيدرات)، حقن. 100 ملغ/مل، أمبولة 10 مل	30
سلفات المغنيسيوم، حقن. 500 ملغ / مل في أمبولة 10 مل	100
هيدروكلوريد الهيدرالازين، مسحوق للحقن. 20 ملغ في أمبولة	60
ثنائي هيدروكلوريد الكينين، محلول للتخفيف للتسريب. 300 ملغ / مل، أمبولة 2 مل	200
هيدروكلوريد ليدوكائين، حقن. 1٪، أمبولة 20 مل	120
هيدروكلوريد ليدوكائين، حقن. 2٪، أمبولة 20 مل	100
هيدروكلوريد ليدوكائين، محلول للحقن. 50 ملغ/مل (5٪)، أمبولة 2 مل	100
كيتامين (في صورة هيدروكلوريد)، حقن (محلول للحقن)، 50 ملغ/مل، قنينة 10 مل	50
كلوريد الصوديوم، محلول للتسريب. ٪ 0.9 (متساوي التوتر)، زجاجة 1 لتر + طاقم التسريب، معقم يُستخدم مرة واحدة	300
الجلوكوكول، محلول للتسريب. 5٪ (متسق الضغط التناضحي)، زجاجة 1 لتر + طاقم التسريب، معقم يُستخدم مرة واحدة	300

100	ديكستران 07، محلول للحقن. 6٪ زجاجة 500 مل + طاقم التسريب. معقم. يُستخدم مرة واحدة
400	**أقراص ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم. تحتوي على 1.67 غرام NaDCC، علبه 200
100	محلول الكلورهيكسدين. زجاجة 500 مل
30	غلوكونات الكلورهيكسدين. مركز للمحلول. 5٪ زجاجة 1000 مل
	<b>الأجهزة الطبية القابلة للتجديد</b>
60	أنبوب شفط. CH10. الطول 50 سم. طرف مخروطي. معقم. يُستخدم مرة واحدة
60	أنبوب شفط. CH14. الطول 50 سم. طرف مخروطي. معقم. يُستخدم مرة واحدة
500	قنية وريدية قصيرة. قياس القطر 20. معقمة تُستخدم مرة واحدة
100	قنية وريدية قصيرة. قياس القطر 18. معقمة تُستخدم مرة واحدة
200	مشبك للحيل السري. معقم. يُستخدم مرة واحدة
400	سرنجة لور. 1 مل. معقمة. تُستخدم مرة واحدة
1400	سرنجة لور. 2 مل. معقمة. تُستخدم مرة واحدة
500	سرنجة لور. 5 مل. معقمة. تُستخدم مرة واحدة
600	سرنجة لور. 10 مل. معقمة. تُستخدم مرة واحدة
3000	إبرة لور. قياس القطر 21 (0.8 × 40 مم). معقمة. تُستخدم مرة واحدة
100	إبرة لور. قياس القطر 23 (0.6 × 25 مم). معقمة. تُستخدم مرة واحدة
10	فرشاة يد بلاستيكية للكحت
400	قفازات جراحية. مقاس 8. معقمة تُستخدم مرة واحدة. زوج
400	قفازات جراحية. مقاس 7. معقمة تُستخدم مرة واحدة. زوج
10	قفازات أمراض النساء. مقاس متوسط. معقمة تُستخدم مرة واحدة. زوج
5	قفازات الكشف. مقاس متوسط. تُستخدم مرة واحدة. علبه 100
24	غرز اصطناعية. قابلة للامتصاص. DEC4 (1) إبرة 3/8. 36 مم. مثلثة. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. علبه 12
24	غرز اصطناعية. قابلة للامتصاص. DEC3 (2/0) إبرة 1/2. 30 مم. مستديرة. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. علبه 12
12	غرز اصطناعية. غير قابلة للامتصاص. DEC3 (2/0) إبرة 3/8. 30 مم. مثلثة. معقمة. تُستخدم مرة واحدة. علبه 12
150	فسطرة فولي. CH14. معقمة تُستخدم مرة واحدة
150	كيس جميع البول. 2000 مل
6	غطاء جراحي نسيجي. 100 سم × 150 سم
120	إبرة العمود الفقري. قياس القطر 22 (0.7 × 9 مم). معقمة. تُستخدم مرة واحدة
100	لفة شناش. 10 × 10 سم. معقمة. تُستخدم مرة واحد. لفة 5
50	شريط لاصق. أكسيد الزنك. 2.5 سم × 5 سم
5	شريط لاصق. أكسيد الزنك. 10. مثقب. سم × 5 سم
100	شفرة مشرط. رقم 22. معقمة. تُستخدم مرة واحدة.
25	صندوق السلامة. للحقن والإبر المستعملة. سعة 5 لترات
10	كيس (مظروف) بلاستيكي للعقاقير. 15 × 10 سم تقريباً. عبوة 100
2	نظارات السلامة. المقاس المعتاد
20	اختبار الحمل. مستقرة بالنسبة لدرجات الحرارة

المبادئ التوجيهية للعلاج	
1 بالإنجليزية 1 بالفرنسية	.srotcod dna seviwdim rof ediug A .htribdlihc dna ycnangerp ni snoitacilpmoc gniganaM جنييف، منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولي، 2003

\* يجب أن يبقى الأوكسيتوسين بارداً أثناء النقل والتخزين. ولذلك يجباً ويرسل بشكل منفصل.

\*\* NaDCC: كل قرص فوار يطلق 1غم من الكلور المتاح عندما يذوب في الماء.

#### ملاحظات

لا تتضمن هذه المجموعة الديازيبام والبنزازوسين القابل للحقن نظراً لاشتراطات ترخيص الاستيراد/التصدير. ينبغي شراء هذه الأدوية محلياً (ديازيبام، 2 مل، 5 ملغ/مل، (50 أمبولة)، وبنزازوسين 30 ملغ/مل، 1 مل (6 أمبولة)).  
المنتجات الصحية الملائمة ثقافياً ينبغي شراؤها محلياً متى أمكن.

المجموعة 12  
نقل الدم

- الاستخدام:** لإجراء عمليات نقل الدم المأمونة بعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والزهري. والتهاب الكبد بآء وجيم.
- الإرشادات:** يقتصر استخدام هذه المجموعة على فني المختبر المدربين الذين يمكنهم الوصول إلى مرافق المختبرات الأساسية..
- السكان المستهدفون:** الأشخاص الذين يحتاجون إلى عمليات نقل الدم.
- المحتويات:** (مأخوذة عن منظمة أطباء بلا حدود)

1	اختبار فصيلة الدم. مستضد A. 10 مل. قطارة*
1	اختبار فصيلة الدم. مستضد A + B. 10 مل. قطارة*
1	اختبار فصيلة الدم. مستضد B. 10 مل. قطارة*
1	اختبار العامل الريسوسي. مستضد D. 10 مل. قطارة*
1	اختبار فيروس نقص المناعة 1 + 2 السريع. 100 اختبار مجموعة
1	الاختبار السريع لمستضد التهاب الكبد بآء السطحي (HBsAg). مجموعة 100 اختبار
1	الاختبار السريع لفيروس التهاب الكبد الوبائي (جيم). 100 اختبار*
1	الاختبار السريع لاستعادة البلازما (RPR) (للزهري). 100 اختبار*
1	مضواء (مقياس ضوء). هيموكيو إتش بي 301
200	أنابيب شعرية لإتش بي 301
1	سوار الضغط. كيس 500/1000 مل
8	بطارية. خلية جافة. AA. قلووية. 1.5 فولت. للمضواء (مقياس الضوء)
50	كيس دم + CPD (سيترات- فوسفات- دكستروز). 250 مل
100	مجموعة التبرع بالدم
5	قفازات كشف. متوسطة الحجم تُستخدم مرة واحدة. عبوة تحتوي على 100

\* يجب أن تظل هذه العناصر باردة أثناء النقل والتخزين. ولهذا يجب تغليفها وإرسالها بشكل منفصل.

## مقاييس مجموعات الصحة الإنجابية

المجموعة	الأبعاد والوزن
المجموعة 0 اللوازم الإدارية/اللوازم التدريب	1 صندوق: 60 × 40 × 28 سم (0.067 م <sup>3</sup> ). 16.5 كغم
المجموعة أ1 الأوقية الذكورية	4 صناديق. كل منها 32 × 45 × 51 سم (0.073 م <sup>3</sup> ). 15.5 كغم المجموع: 0.29 م <sup>3</sup> . 62 كغم
المجموعة 1ب الأوقية الأنثوية	1 صندوق: 58 × 38 × 30 سم (60.06 م <sup>3</sup> ). 7 كغم
المجموعة أ2 الولادة النظيفة. الأفراد	4 صناديق. كل منها 34.5 × 44 × 52 سم (970.0 م <sup>3</sup> ). 24 كغم المجموع: 0.316 م <sup>3</sup> . 92.0 كغم
المجموعة 2ب الولادة النظيفة. القابلة	1 صندوق: 41.5 × 26.5 × 35 سم (0.038 م <sup>3</sup> ). 10.25 كغم
المجموعة 3 علاج الاغتصاب	1 صندوق: 43 × 32 × 17 سم (730.0 م <sup>3</sup> ). 7 كغم
المجموعة 4 وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن	1 صندوق: 60 × 40 × 36 سم (0.086 م <sup>3</sup> ). 15 كغم
المجموعة 5 علاج العدوى المنقولة جنسياً	1 صندوق: 60 × 50 × 50 سم (0.15 م <sup>3</sup> ). 35 كغم
المجموعة أ6 المساعدة في الولادة السريرية المعدات القابلة لإعادة الاستخدام	2 صندوق، صندوق: 60 × 50 × 50 سم (0.150 م <sup>3</sup> ). 21 كغم 1 صندوق: 60 × 40 × 36 سم (0.086 م <sup>3</sup> ). 10 كغم المجموع: 0.236 م <sup>3</sup> . 31 كغم
المجموعة 6ب المساعدة في الولادة السريرية الأدوية والأدوات المعدة للاستخدام لمرة واحدة	5 صناديق. 1 صندوق: 60 × 40 × 36 سم (0.086 م <sup>3</sup> ). 28.5 كغم 1 صندوق: 60 × 40 × 36 سم (0.086 م <sup>3</sup> ). 27.5 كغم 1 صندوق: 60 × 40 × 28 سم (0.067 م <sup>3</sup> ). 21 كغم 1 صندوق: 60 × 40 × 36 سم (0.086 م <sup>3</sup> ). 24 كغم (المجموع للأربع صناديق: 0.325 م <sup>3</sup> . 101 كغم) بالإضافة إلى: يُحفظ بارداً 1 صندوق: 16 × 9 × 7 سم (0.01 م <sup>3</sup> ). 0.5 كغم المجموع: 0.335 م <sup>3</sup> . 101.5 كغم
المجموعة 7 اللواالب الرحمية	صندوق: 60 × 40 × 36 سم (0.086 م <sup>3</sup> ). 14 كغم
المجموعة 8 إدارة الإجهاض التلقائي ومضاعفات الإجهاض	2 صندوق. 1 صندوق: 60 × 50 × 50 سم (0.150 م <sup>3</sup> ). 36 كغم بالإضافة إلى: يحفظ بارداً 1 صندوق: 40 × 30 × 20 سم (0.024 م <sup>3</sup> ). 2 كغم المجموع: 0.174 م <sup>3</sup> . 38 كغم
المجموعة 9 خياطة التمزق (عق الرحم والمهبل) والفحص المهلي	1 صندوق: 60 × 40 × 28 سم (0.067 م <sup>3</sup> ). 15 كغم
المجموعة 10 التوليد بشفط الجنين	1 صندوق: 43 × 33 × 21 سم (0.030 م <sup>3</sup> ). 3 كغم

الأبعاد والوزن	المجموعة
1 صندوق، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م <sup>3</sup> )، 20 كغم	المجموعة 11أ مستوى الإحالة المعدات القابلة لإعادة الاستخدام
<p>35 صندوق.</p> <p>صندوق 1، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 26 كغم</p> <p>صندوق 2، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 22 كغم</p> <p>صندوق 3، 60 × 40 × 36 سم (0.120 م<sup>3</sup>)، 23 كغم</p> <p>صندوق 4، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 22 كغم</p> <p>صندوق 5، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 20 كغم</p> <p>صندوق 6، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 23 كغم</p> <p>صندوق 7، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 23 كغم</p> <p>صندوق 8، 60 × 40 × 50 سم (0.120 م<sup>3</sup>)، 30 كغم</p> <p>صندوق 9، 60 × 40 × 50 سم (0.120 م<sup>3</sup>)، 30 كغم</p> <p>صندوق 10، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 27 كغم</p> <p>صندوق 11، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 27 كغم</p> <p>صندوق 12، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 27 كغم</p> <p>صندوق 13، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 27 كغم</p> <p>صندوق 14، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 32 كغم</p> <p>صندوق 15، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 16، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 17، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 18، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 19، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 20، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 21، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 22، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 23، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 24، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 25، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 26، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 27، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 28، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 29، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 30، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 31، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 32، 60 × 40 × 36 سم (0.086 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 33، 60 × 40 × 50 سم (0.120 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>صندوق 34، 60 × 40 × 50 سم (0.120 م<sup>3</sup>)، 36 كغم</p> <p>(مجموع الأربعة وثلاثين صندوقاً: 3.094 م<sup>3</sup>، 1079 كغم)</p> <p>بالإضافة إلى:</p> <p>يُحفظ بارداً، صندوق 35، 40 × 30 × 30 سم (0.036 م<sup>3</sup>)، 4 كغم</p> <p>المجموع: 3.130 م<sup>3</sup>، 1083 كغم</p>	<p>المجموعة 11ب مستوى الإحالة الأدوية والمعدات المعدة للاستخدام مرة واحدة</p>
<p>2 صندوق:</p> <p>1 صندوق، 60 × 40 × 50 سم (0.120 م<sup>3</sup>)، 15 كغم</p> <p>بالإضافة إلى:</p> <p>يُحفظ بارداً، 1 صندوق، 40 × 30 × 30 سم (0.036 م<sup>3</sup>)، 3 كغم</p> <p>المجموع: 0.156 م<sup>3</sup>، 18 كغم</p>	<p>المجموعة 12 نقل الدم</p>

الافتراضات المستخدمة في حساب الإمدادات

تعتمد محتويات مجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية على افتراضات مستمدة من البيانات الوبائية، واللمحات المختصرة عن السكان، وأنماط الأمراض والخبرة المكتسبة من استخدام المجموعة في حالات الطوارئ؛ فيما يلي سرد للافتراضات، وتُحسب جميع المجموعات لتلبية احتياجات الصحة الإنجابية للسكان لمدة ثلاثة أشهر.

عدد السكان المستهدفين			افتراضات البيانات السكانية
المجموعتان 11 و12 (150 ألف نسمة)	المجموعات 6-10 (30 ألف نسمة)	المجموعات 1-5 (10 آلاف نسمة)	
		2000	• 20% من البالغين الذكور
		2500	• 25% من النساء بين عمر 5-94 سنة
6000	1200	400	• معدل الولادات الأولي يبلغ 4%
1500	300	100	• عدد حالات الولادة في 12 شهر
	900	300	• عدد حالات الولادة في 3 أشهر
		50	• عدد السيدات الحوامل
		375	• 2% من النساء بين عمر 15-49 سنة يتعرضن للتعنف الجنسي
		150	• 15% من النساء بين عمر 15-49 يستخدمن وسائل منع الحمل، من بينهن:
		210	- 40% يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الفم
	60	20	- 55% يستخدمن وسائل منع الحمل بالحقن
		60	- 5% يستخدمن اللوالب
	45		• 20% من حالات الحمل تنتهي بالإجهاض التلقائي أو الإجهاض المتعمد غير الآمن
			• 15% من السيدات اللاتي يلدن يعانين من تمزق مهبلي
75			• 5% من حالات الولادة تستلزم إجراء جراحة قيصرية









# Reproductive Health Kits for Crisis Situations

**The following members of the Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis Situations have been involved in the production of these Kits:**

- Family Health International (FHI)
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
- International Rescue Committee (IRC)
- International Planned Parenthood Federation (IPPF)
- Marie Stopes International (MSI)
- Médecins sans Frontières Belgium (MSF)
- United Nations Children's Fund (UNICEF)
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
- United Nations Population Fund (UNFPA)
- World Health Organization (WHO)
- Women's Refugee Commission (WRC)
- CARE International



UNITED NATIONS POPULATION FUND  
HUMANITARIAN RESPONSE BRANCH

605 Third Avenue  
New York, N.Y. 10158, U.S.A.

E-mail: [hrb@unfpa.org](mailto:hrb@unfpa.org), Web: [www.unfpa.org](http://www.unfpa.org)